

除草剤

名称:アピロトップMX 1キロ粒剤75
種類:ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル・メソトリオン粒剤

適用の範囲と使用方法

2014年9月24日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリフタリドを含む農薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	メソトリオンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ、クログワイ(北海道を除く)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ(北海道を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで	壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	北海道、東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		移植後5日～ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで	砂壤土								
		移植時				田植同時散布機で施用					
直播水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで	壤土～埴土			湛水散布	全域				