

殺虫剤

名称:アファームエクセラ顆粒水和剤
 種類:エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤

適用の範囲と使用方法

2015年03月18日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ タマナギンウワバ	1000～ 1500倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	ネギアザミウマ	1000倍						
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 1500倍						
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ							
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	1500倍	収穫14日前 まで					

殺虫剤

名称:アファームエクセラ顆粒水和剤
種類:エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤

適用の範囲と使用方法

2015年03月18日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	シロイチモ ジヨトウ	1000～ 1500倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内	
	ネギアザミ ウマ	1000倍							
ネギハモグ リバエ									
レタス	オオタバコ ガ	1000～ 1500倍		収穫3日前 まで					
	ナモグリバ エ	1000倍							
非結球レタス	オオタバコ ガ	1000～ 1500倍							
ピーマン	ハスモンヨ トウ	1500倍		収穫前日 まで	2回以内		散布	2回以内	4回以内
なす	オオタバコ ガ								
トマト	オオタバコ ガ								
ミニトマト	ハモグリバ エ類				5回以内			2回以内	
きゅうり	ミナミキイロ アザミウマ ウリノメイガ		2回以内		3回以内				
のぎわな	コナガ								
チンゲンサイ	ハモグリバ エ類	1000倍	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内		
すいか	ミナミキイロ アザミウマ								
メロン	アザミウマ 類 ウリノメイガ		収穫前日 まで	2回以内		2回以内		2回以内	