

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数
みかん	アザミウマ類 ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍	200～ 700L/10a	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内
ヤングコーン	オオタバコガ ヨトウムシ			収穫前日 まで			
未成熟とうもろ こし				収穫3日前 まで			
とうもろこし (子実)				収穫30日前 まで			
かんしょ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	100～300L /10a	100～300L /10a	収穫7日前 まで	3回以内		3回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ			収穫3日前 まで	2回以内		2回以内
さやいんげん	ハモグリバエ類			収穫前日 まで			
さやえんどう	ハスモンヨトウ			収穫3日前 まで			
豆類 (未成熟、ただ し、さやいんげ んを除く)	ハモグリバエ類	2000倍	100～300L /10a	収穫3日前 まで	3回以内		3回以内
すいか	アザミウマ類						
きゅうり	ウリノメイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	2000倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	

殺虫剤

名称:アフーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数
ズッキーニ にがうり	オオタバコガ	2000倍	100~300L /10a	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内
うり類 (漬物用)	ハスモンヨトウ ハダニ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類			収穫前日 まで			
	メロン	アザミウマ類		1000~ 2000倍	2回以内		
	ウリノメイガ ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍		5回以内			
トマト ミニトマト	ハモグリバエ類 オオタバコガ トマトサビダニ コナジラミ類				2回以内		
なす	アザミウマ類 ハモグリバエ類 チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ	2回以内		2回以内			
ピーマン	オオタバコガ				2回以内		
とうがらし類		収穫7日前 まで					

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	1000～ 2000倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ			収穫3日前 まで				
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ			収穫7日前 まで				
だいこん	コナガ アオムシ			収穫3日前 まで	3回以内			3回以内
カリフラワー	コナガ アオムシ アザミウマ類 オオタバコガ			収穫3日前 まで	3回以内			
ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ			収穫7日前 まで	2回以内			
なばな類	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ							

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数					
のざわな チンゲンサイ	アオムシ	1000～ 2000倍	100～300L /10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内					
	コナガ				2回以内			2回以内				
こまつな	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫7日前 まで	1回		1回					
パセリ					アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ		1000～ 2000倍	収穫7日前 まで	3回以内	3回以内		
セルリー	ハモグリバエ類	2000倍		3回以内							3回以内	
	オオタバコガ											2000倍
	タバコガ		2000倍			3回以内						
ねぎ	ヨトウムシ	2000倍		3回以内	3回以内							
	ハスモンヨトウ		2000倍			3回以内	3回以内					
わけぎ	ハモグリバエ類	1000倍		収穫7日前 まで	2回以内			2回以内				
あさつき			シロイチモジヨトウ			1000～ 2000倍	2回以内		2回以内			
しゅんぎく	ハモグリバエ類	2000倍	2回以内	2回以内	2回以内							
	アザミウマ類					2000倍	2回以内	2回以内				
	シロイチモジヨトウ	2000倍	2回以内	2回以内	2回以内							

殺虫剤

名称:アフーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数
エンダイブ	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
すいぜんじな	タマナギンウワバ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ			収穫前日 まで			
	みつば			ハダニ類 キアゲハ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			
しそ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハダニ類 シソサビダニ			収穫7日前 まで			
いちご	オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハダニ類			収穫前日 まで			
オクラ	オオタバコガ						
アスパラガス	ハスモンヨトウ ヨトウムシ						

殺虫剤

名称:アフーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ ハウレンソウケナ ガコナダニ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内	
かぶ	コナガ							
トレビス	オオタバコガ	1000倍		収穫前日 まで	3回以内		3回以内	
非結球メキャ ベツ	ハスモンヨトウ			収穫7日前 まで				
にんじん	ハモグリバエ類	2000倍		収穫前日 まで	2回以内		散布、但し 花穂の発生 期にはマル チフィルム 被覆により 散布液が直 接花穂に飛 散しない状 態で使用する	2回以内
みょうが (花穂)	ハダニ類			みょうが(花 穂)の収穫 前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合に あつては開 花期終了ま で				
みょうが (茎葉)				収穫7日前 まで				
エンサイ				収穫3日前 まで				
メキャベツ	ハスモンヨトウ	1000倍		収穫7日前 まで	2回以内		散布	3回以内
葉しょうが	収穫前日 まで							
かぼちゃ	アザミウマ類	2000倍	収穫前日 まで	1回	散布	2回以内		
食用ぎく			収穫14日前 まで					
モロヘイヤ			ハスモンヨトウ				収穫前日 まで	3回以内

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数
茶	チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホソガ チャハマキ	1000～ 2000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	1回		1回
	チャノホコリダニ ハスモンヨトウ	2000倍					
きく	ミカンキイロアザミウマ	1000～ 2000倍	100～ 300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ストック	コナガ						
マーガレット	ハスモンヨトウ	2000倍					
花き類・ 観葉植物	オオタバコガ ハモグリバエ類 ヨトウムシ類	1000倍					
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍					