

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年05月30日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------|----------|---------|------|------------------------|------------------|---------|------|------|
| みかん | アザミウマ類 ミカンハモグリガ | 1000~2000倍 | 200~700L /10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | | | | |
| ヤングコーン | オオタバコガ ヨトウムシ | | | 収穫前日まで | | | | | | | |
| 未成熟 とうもろこし | | | | 収穫3日前まで | | | | | | | |
| とうもろこし (子実) | | | | 収穫30日前まで | | | | | | | |
| えだまめ | ハスモンヨトウ | | | 2000倍 | | | | 100~300L /10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | ハモグリバエ類 | | | | | | | | 収穫前日まで | | |
| さやいんげん | | | | | | | | | 収穫3日前まで | | |
| 豆類 (未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | | 収穫3日前まで | | | | | | | | | |
| ズッキーニ にがうり | オオタバコガ | 1000倍 | 100~300L /10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | |
| とうがらし類 | | | | | | | | | | | |
| トレビス | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | |
| すいか | ウリノメイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | | | | | | | | | | |
| きゅうり | | | | | | | | | | | |
| うり類(漬物用) | アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ハダニ類 ハモグリバエ類 | 2000倍 | | | | | | | | | |

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年05月30日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 |
|---------------|--|------------|------------------|--------|---------|------|------------------------|
| メロン | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 100~300L /10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| | ウリノメイガ コナジラミ類 ハモグリバエ類 | 2000倍 | | | | | |
| トマト ミニトマト | オオタバコガ コナジラミ類 トマトサビダニ ハモグリバエ類 | | | | 2000倍 | | 2回以内 |
| なす | アザミウマ類 オオタバコガ コナジラミ類 チャノホコリダニ ハスモンヨトウ ハダニ類 ハモグリバエ類 | 1000~2000倍 | | | | | |
| ピーマン | オオタバコガ コナジラミ類 | | | | 1000倍 | | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ コナガ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ | 1000倍 | | | | | |
| 非結球メキャベツ | ハスモンヨトウ | | | | 1000倍 | | 3回以内 |
| メキャベツ | | 1000~2000倍 | | | | | |
| レタス 非結球レタス | オオタバコガ ナモグリバエ ハスモンヨトウ | | 1000~2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | | |

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年05月30日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 |
|----------------|--|------------|------------------|---------|---------|------|------------------------|
| はくさい | アオムシ コナガ ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 100~300L /10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| カリフラワー | アオムシ アザミウマ類 オオタバコガ コナガ | | | 収穫3日前まで | | | |
| ブロッコリー | アオムシ オオタバコガ コナガ ヨトウムシ | | | 収穫7日前まで | | | |
| なばな類 | アオムシ コナガ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ | | | 2回以内 | | | |
| だいこん | アオムシ コナガ | | | 3回以内 | | | |
| のぎわな チンゲンサイ | アオムシ | 2000倍 | 100~300L /10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 |
| こまつな かぶ | コナガ | | | 2回以内 | | | |
| パセリ | ハスモンヨトウ | | | 1回 | | | |

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年05月30日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 | | |
|----------------------------------|---|---|------------------|---------|---------|------|------------------------|-------|------|
| 非結球あぶらな科葉菜類(のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | アオムシ アザミウマ類 コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 100~300L /10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | |
| | セルリー | オオタバコガ タバコガ ハモグリバエ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ | | | | | | 2000倍 | |
| ねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | | | | | | | |
| わけぎ あさつき | シロイチモジヨトウ | 1000~2000倍 | | | | | | | |
| かんしょ | | | | | | | | | |
| エンサイ 葉しょうが | ハスモンヨトウ | | | | | | | | |
| しゅんぎく | アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類 | 2000倍 | | | | | | 2回以内 | 2回以内 |
| エンダイブ | オオタバコガ ハスモンヨトウ | | | | | | | | |

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年05月30日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 |
|--------|---|-------|------------------|---------------------------|---------|------|------------------------|
| すいぜんじな | アザミウマ類 オオタバコガ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ヨトウムシ | 2000倍 | 100~300L /10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みつば | キアゲハ ハスモンヨトウ ハダニ類 ヨトウムシ | | | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | | | |
| しそ | シソサビダニ ハスモンヨトウ ハダニ類 ヨトウムシ | | | 収穫7日前まで | | | |
| いちご | オオタバコガ ハスモンヨトウ ハダニ類 ヨトウムシ | | | 収穫前日まで | | | |
| オクラ | オオタバコガ | | | | | | |
| アスパラガス | ハスモンヨトウ ヨトウムシ | | | | | | |
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ ホウレンソウケナガ コナダニ | | | | | | |

殺虫剤

名称:アファーム乳剤
種類:エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年05月30日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 |
|----------|--|------------|------------------|---|---------|------|------------------------|
| みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300L /10a | みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、 花穂を収穫しない場合に あつては開花期終了まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みょうが(花穂) | | | | 収穫前日まで | | | |
| かぼちゃ | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 200~400L /10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| モロヘイヤ | ハスモンヨトウ | | | | | | |
| にんじん | ハモグリバエ類 | | | | | | |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノホコリダニ ハスモンヨトウ | | | | | | |
| 食用ぎく | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 100~300L /10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | | | | | | | |
| ストック | コナガ | | | | | | |
| マーガレット | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300L /10a | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| 花き類・観葉植物 | アザミウマ類 | 1000倍 | | | | | |
| | オオタバコガ ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 | | | | | | |