

殺菌剤

名称:アミスター10フロアブル
種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病	1000～ 1500倍	200～ 700L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
	うどんこ病 炭疽病	1000倍					
ぶどう	黒とう病 灰色かび病 べと病 枝膨病 晩腐病 褐斑病 さび病			収穫30日前 まで	3回以内		
	おうとう						灰星病 褐色せん孔病 炭疽病
				もも			灰星病 黒星病 ホモプシス腐 敗病
	ネクタリン						灰星病 黒星病
	パッションフ ルーツ			円斑病 疫病			
	かき	うどんこ病 落葉病 炭疽病 黒点病 すす点病		収穫7日前 まで			

殺菌剤

名称:アミスター10フロアブル
種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
りんご(ふじ、王林、ジョナゴールド、つがる、千秋、さんさ、紅玉、シナノスイート、昂林、涼香の季節)	うどんこ病	1000倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内
いちじく	そうか病 疫病 黒葉枯病 さび病			収穫前日まで			
	すもも			灰星病 すす点病			
びわ				炭疽病			
うめ	黒星病 すす斑病	1500倍		収穫前日まで			
マンゴー	炭疽病	1000倍			1回		1回
グアバ(果実)				収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
オリーブ				収穫30日前まで	2回以内	2回以内	
オリーブ(葉)				収穫前日まで	3回以内	3回以内	
ピタヤ				炭腐病			
バナナ	黒星病		収穫7日前まで				