

## 殺菌剤

名称:アミスター10フロアブル  
種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

2014年05月28日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数							
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病	1000～ 1500倍	200～ 700L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内							
	うどんこ病 炭疽病	1000倍						3回以内	3回以内					
ぶどう	黒とう病 灰色かび病 べと病 枝膨病 晩腐病 褐斑病 さび病			1000倍	収穫30日前 まで		3回以内			3回以内				
	おうとう										灰星病 褐色せん孔病 炭疽病	1000倍	3回以内	3回以内
											もも			
ネクタリン	灰星病 黒星病			1000倍	3回以内		3回以内							
パッションフルーツ	円斑病 疫病									1000倍	3回以内	3回以内		
かき	うどんこ病 落葉病 炭疽病 黒点病 すす点病	1000倍		3回以内	3回以内		3回以内							

## 殺菌剤

名称:アミスター10フロアブル  
種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

2014年05月28日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数		
りんご(ふじ、王林、ジョナゴールド、つがる、千秋、さんさ、紅玉、シナノスイート、昂林、涼香の季節)	うどんこ病	1000倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内		
いちじく	そうか病 疫病 黒葉枯病 さび病			収穫前日まで					
	すもも			灰星病 すす点病					
びわ	炭疽病			収穫7日前まで					
うめ	黒星病 すす斑病	1500倍		収穫前日まで	1回			3回以内	3回以内
マンゴー	炭疽病	1000倍		収穫7日前まで					
グアバ(果実)				収穫30日前まで	2回以内			2回以内	
オリーブ			3回以内	3回以内					
オリーブ(葉)									
ピタヤ	炭腐病	3回以内	収穫前日まで	3回以内	3回以内				
バナナ	黒星病		収穫7日前まで						