

殺菌剤

名称:アミスター10フロアブル
種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

2014年05月28日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数 | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------|------|----------------------|------|----------------------|------------|--------|------|
| なし | 黒星病 黒斑病 輪紋病 | 1000～ 1500倍 | 200～ 700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | | | | | |
| | うどんこ病 炭疽病 | 1000倍 | | | | | | | | | | |
| ぶどう | 黒とう病 灰色かび病 べと病 枝膨病 晩腐病 褐斑病 さび病 | | | 1000倍 | 収穫30日前 まで | | 3回以内 | 3回以内 | | | | |
| | おうとう | | | | | | | | 灰星病 褐色せん孔病 炭疽病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| | | | | | | | | | もも | | | |
| | ネクタリン | | | | | | | | | 灰星病 黒星病 | 収穫前日まで | 3回以内 |
| | パッションフルーツ | | | | | | | | 円斑病 疫病 | 収穫前日まで | | |
| かき | うどんこ病 落葉病 炭疽病 黒点病 すす点病 | 収穫前日まで | | 3回以内 | 3回以内 | | | | | | | |

殺菌剤

名称:アミスター10フロアブル
種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

2014年05月28日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数 | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|-------------|---------|------|----------------------|------|------|
| りんご(ふじ、王林、ジョナゴールド、つがる、千秋、さんさ、紅玉、シナノスイート、昂林、涼香の季節) | うどんこ病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | |
| いちじく | そうか病 疫病 黒葉枯病 さび病 | | | 収穫前日まで | | | | | |
| | すもも | | | 灰星病 すす点病 | | | | | |
| びわ | 炭疽病 | | | 収穫7日前まで | | | | | |
| うめ | 黒星病 すす斑病 | 1500倍 | | 収穫前日まで | 1回 | | | 3回以内 | 3回以内 |
| マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | | 収穫7日前まで | | | | | |
| グアバ(果実) | | | | 収穫30日前まで | | | | | |
| オリーブ | | | 収穫前日まで | | | | | | |
| オリーブ(葉) | | | 収穫7日前まで | | | | | | |
| ピタヤ | 炭腐病 | 3回以内 | 収穫前日まで | 3回以内 | | 3回以内 | | | |
| バナナ | 黒星病 | | 収穫7日前まで | | | | | | |