

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年09月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL/乾燥種子1kg	は種前	1回	種子吹き付け処理	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
	株腐病		8mL/乾燥種子1kg			塗沫処理	
	うどんこ病 赤さび病	2000~3000倍	100~200L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
だいでず	紫斑病		100~300L/10a				2回以内
	腐敗粒	16~24倍	800mL/10a	3回以内	3回以内		
えだまめ	べと病					2000倍	100~300L/10a
きゅうり	うどんこ病 べと病	1500~2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内		
	灰色かび病 菌核病					1500倍	
	うどんこ病 べと病 炭疽病	2000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内		散布
にがうり	うどんこ病 べと病 炭疽病						
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	1500~2000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	4回以内	
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病						2000倍
すいか	つる枯病 炭疽病	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内	

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年09月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	
トマト	葉かび病 灰色かび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
なす	うどんこ病 すすかび病							
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病			収穫3日前まで	3回以内		3回以内	
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病			収穫前日まで	4回以内		4回以内	
ねぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病 葉枯病 リゾクトニア葉 鞘腐敗病			収穫3日前まで				5回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は4回以内)
わけぎ	さび病 べと病			収穫7日前まで				4回以内
あさつき	黄斑病 黒斑病			収穫3日前まで				
にら	白斑葉枯病			収穫14日前まで				2回以内
にら(花茎)				収穫前日まで				
にんにく	さび病 葉枯病			収穫7日前まで	3回以内		3回以内	

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年09月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数			
はくさい	べと病 黒斑病 白さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内			
	白斑病	2000～3000倍								
レタス	菌核病 灰色かび病 べと病 すそ枯病	2000倍	3L/m ²	収穫30日前まで	2回以内	土壌灌注	4回以内 (土壌灌注は2回以内)			
	ビッグベイン病									
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内			
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病									
ブロッコリー	べと病 黒すす病	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内			
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く)	白さび病							収穫7日前まで	2回以内	2回以内
みずな										3回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年09月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
こまつな チンゲンサイ タアサイ	白さび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は2回以 内)
いちご	うどんこ病	1500～2000倍		収穫前日 まで	苗床:4回以内		7回以内 (苗床では4回以 内、本圃では3回 以内)
	炭疽病	2000倍			本圃:3回以内		
					苗床:4回以内		
灰色かび病	1500倍	本圃:3回以内					
		苗床:4回以内					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000倍			本圃:3回以内		
				苗床:4回以内			
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500倍		収穫14日前 まで	3回以内		4回以内(灌注は1 回以内、散布は3 回以内)
		1500～4000倍					
	根腐病	500倍	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m ²)			定植前	

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
 種類: アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年09月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による) もち病	2000倍	100～ 400L/10a	摘採14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
エンダイブ	菌核病 すそ枯病		100～ 300L/10a	収穫21日前 まで	1回		1回
らっきょう	さび病			収穫3日前 まで	3回以内		3回以内
パセリ	うどんこ病			収穫45日前 まで	1回		4回以内 (粒剤は3回以内、 水和剤は1回以 内)
みつば	灰色かび病			収穫14日前ま で 但し、伏せ 込み栽培は伏 せ込み前まで			1回
みょうが (花穂)	紋枯病			3L/m ²	収穫3日前 まで	2回以内	土壌灌注
みょうが (茎葉)			みょうが(花 穂)の収穫3日 前まで 但し、 花穂を収穫し ない場合に あつては開 花期終了まで				
しそ	斑点病		100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	2回以内
	さび病						
クレソン	斑点病		100～ 300L/10a	収穫21日前 まで	3回以内	散布	3回以内
だいこん	白さび病 ワッカ症	収穫14日前 まで					

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
 種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年09月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数		
せり	葉枯病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は4回以内)		
あずき	さび病		60～200L/10a				3回以内	3回以内	3回以内
	炭疽病								
いんげんまめ									
葉ごぼう	うどんこ病				収穫21日前まで		1回	1回	
こおにたびらこ ははこぐさ	菌核病				収穫30日前まで				
ズッキーニ	うどんこ病				収穫前日まで		4回以内	4回以内	
オクラ							2回以内	6回以内 (全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内)	
							4回以内	4回以内 (粒剤は3回以内)	
ピーマン	灰色かび病								
畑わさび	白さび病		100～300L/10a		収穫7日前まで		2回以内	2回以内	
わさび					畑育苗期				
かぶ					収穫7日前まで				3回以内
	白斑病		3回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)						
さやいんげん	灰色かび病 菌核病			収穫前日まで	3回以内	3回以内			
さやえんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病			収穫前日まで	3回以内	3回以内			

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年09月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数		
実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
セルリー	斑点病			収穫3日前まで	4回以内		4回以内		
未成熟 そらまめ	さび病			3回以内	3回以内				
モロヘイヤ	灰色かび病 黒星病			収穫前日まで	4回以内		4回以内		
ばれいしょ	夏疫病 疫病	3000～4000倍	—	収穫7日前まで	3回以内	種いも瞬間浸漬 植溝内土壌散布	5回以内 (種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内)		
	黒あざ病	500倍		植付前	1回				
		100～200倍		植付時					
	銀か病	100倍	20L/10a						
やまのいも	葉渋病 炭疽病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
さといも	疫病			収穫14日前まで					
せんぶり	さび病			収穫7日前まで					
みしまさいこ	炭疽病			収穫21日前まで	4回以内		4回以内		
しゅんぎく				収穫前日まで	2回以内		2回以内		
食用ぎく	白さび病			2000～3000倍	100～180L/10a		発病初期	5回以内	5回以内
きく							2回以内	2回以内	
たばこ	菌核病 赤星病	2000～3000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	2回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)			