

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL/乾燥種子1kg	は種前	1回	種子吹き付け処理	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
	株腐病		8mL/乾燥種子1kg			塗沫処理	
	うどんこ病 赤さび病	2000~3000倍	100~200L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
だいたず	紫斑病		100~300L/10a				2回以内
えだまめ	腐敗粒	16~24倍	800mL/10a	3回以内	3回以内		
	べと病					2000倍	
きゅうり	うどんこ病 べと病	1500~2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内	
	灰色かび病 菌核病						1500倍
	褐斑病 炭疽病	2000倍					
にがうり	うどんこ病 べと病 炭疽病	2000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
うり類(漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	1500~2000倍					4回以内
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000倍		収穫前日まで			
すいか	つる枯病 炭疽病						

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	
トマト	葉かび病 灰色かび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
なす	うどんこ病 すすかび病			収穫3日前まで	3回以内		3回以内	
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病			収穫前日まで	4回以内		4回以内	
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病			収穫3日前まで			5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内)	
ねぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病 葉枯病			収穫7日前まで			4回以内	
わけぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病			収穫3日前まで				
あさつき	白斑葉枯病			収穫14日前まで				2回以内
にら	白斑葉枯病			収穫前日まで			2回以内	
にら(花茎)				収穫7日前まで			3回以内	3回以内
にんにく	さび病 葉枯病							

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
はくさい	べと病 黒斑病 白さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
	白斑病	2000～3000倍					
レタス	菌核病 灰色かび病 べと病 すそ枯病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内(土壌灌注は2回以内)
	ビッグベイン病		3L/m ²	収穫30日前まで	2回以内	土壌灌注	
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
キャベツ	菌核病 株腐病			収穫3日前まで	3回以内		
ブロッコリー	べと病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く)	白さび病			収穫7日前まで	2回以内		
みずな							

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
こまつな チンゲンサイ タアサイ	白さび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内(粒剤は1 回以内、水和剤は 2回以内)
いちご	うどんこ病	1500～2000倍		収穫前日 まで	苗床: 4回以内		7回以内(苗床で は4回以内、本圃 では3回以内)
	炭疽病	2000倍			本圃: 3回以内		
					苗床: 4回以内		
灰色かび病	1500倍	本圃: 3回以内					
		苗床: 4回以内					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000倍			本圃: 3回以内		
				苗床: 4回以内			
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500倍		収穫14日前 まで	3回以内		4回以内(灌注は1 回以内、散布は3 回以内)
		1500～4000倍					
	根腐病	500倍	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m ²)			定植前	

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による) もち病	2000倍	100～ 400L/10a	摘採14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
エンダイブ	菌核病 すそ枯病		100～ 300L/10a	収穫21日前 まで	1回		1回
らっきょう	さび病			収穫3日前 まで	3回以内		3回以内
パセリ	うどんこ病			収穫45日前 まで	1回		4回以内(粒剤は3 回以内、水和剤は 1回以内)
みつば	灰色かび病			収穫14日前ま で 但し、伏せ 込み栽培は伏 せ込み前まで			1回
みょうが (花穂)	紋枯病			3L/m ²	収穫3日前 まで	2回以内	土壌灌注
みょうが (茎葉)			みょうが(花 穂)の収穫3日 前まで 但し、 花穂を収穫し ない場合に あつては開 花期終了まで				
しそ	斑点病		100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	2回以内
	さび病						
クレソン	斑点病		100～ 300L/10a	収穫21日前 まで	3回以内	散布	3回以内
だいこん	白さび病 ワッカ症	収穫14日前 まで		4回以内(粒剤は1 回以内、水和剤は 3回以内)			

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	
せり	葉枯病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内)	
あずき	さび病		60～200L/10a				3回以内	3回以内
	炭疽病							
いんげんまめ								
葉ごぼう	うどんこ病			収穫21日前まで	1回		1回	
こおにたびらこ ははこぐさ	菌核病							収穫30日前まで
ズッキーニ	うどんこ病			収穫前日まで	4回以内		4回以内	
オクラ					2回以内		6回以内(全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内)	
ピーマン					灰色かび病		4回以内	4回以内(粒剤は3回以内)
畑わさび	白さび病		100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内	
わさび								畑育苗期
かぶ								白斑病
さやいんげん	灰色かび病 菌核病			収穫前日まで	3回以内		3回以内	
さやえんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病							

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
セルリー	斑点病			収穫3日前まで	4回以内		4回以内
未成熟 そらまめ	さび病			3回以内	3回以内		3回以内
モロヘイヤ	灰色かび病 黒星病			収穫前日まで	4回以内		4回以内
ばれいしょ	夏疫病 疫病	3000～4000倍	—	収穫7日前まで	3回以内	種いも瞬間浸漬 植溝内土壌散布	5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内)
	黒あざ病	500倍		1回	植付前		
		100～200倍	20L/10a	植付時	1回		
やまのいも	葉渋病 炭疽病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
さといも	疫病			収穫14日前まで			
せんぶり	さび病			収穫7日前まで			
しゅんぎく	炭疽病			収穫前日まで	2回以内		2回以内
みしまさいこ				収穫21日前まで	4回以内		4回以内
食用ぎく	白さび病			収穫前日まで	2回以内		2回以内
きく				発病初期	5回以内		5回以内
たばこ	菌核病			2000～3000倍	100～180L/10a		収穫10日前まで
	赤星病						