

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL/乾燥種子1kg	は種前	1回	種子吹き付け処理	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
	株腐病		8mL/乾燥種子1kg			塗沫処理	
	うどんこ病 赤さび病	2000~3000倍	100~200L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
だいず	紫斑病		100~300L/10a				2回以内
	えだまめ	16~24倍	800mL/10a	3回以内	3回以内		
きゅうり	腐敗粒	2000倍	100~300L/10a			収穫前日まで	4回以内
	べと病						
	うどんこ病 べと病	1500~2000倍					
にがうり	灰色かび病 菌核病 褐斑病 炭疽病	1500倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	うどんこ病 べと病 炭疽病	2000倍					
	うり類(漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病					
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内	
すいか	つる枯病 炭疽病						

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	
トマト	葉かび病 灰色かび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
なす	うどんこ病 すすかび病			収穫3日前まで	3回以内		3回以内	
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病			収穫前日まで	4回以内		4回以内	
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病			収穫3日前まで			5回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は4回以内)	
ねぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病 葉枯病 リゾクトニア葉 鞘腐敗病			収穫7日前まで			4回以内	4回以内
				収穫3日前まで				
わけぎ	さび病 べと病			収穫3日前まで			4回以内	4回以内
あさつき	黄斑病 黒斑病			収穫14日前まで				
にら	白斑葉枯病			収穫前日まで			3回以内	3回以内
にら(花茎)				収穫7日前まで				
にんにく	さび病 葉枯病							

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
はくさい	べと病 黒斑病 白さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
	白斑病	2000～3000倍					
レタス	菌核病 灰色かび病 べと病 すそ枯病	2000倍	3L/m ²	収穫30日前まで	2回以内	土壌灌注	4回以内 (土壌灌注は2回以内)
	ビッグベイン病						
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病			収穫3日前まで	3回以内		
ブロッコリー	べと病 黒すす病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く)	白さび病			収穫7日前まで	2回以内		
みずな							

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
こまつな チンゲンサイ タアサイ	白さび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は2回以 内)
いちご	うどんこ病	1500～2000倍		収穫前日 まで	苗床:4回以内		7回以内 (苗床では4回以 内、本圃では3回 以内)
	炭疽病	2000倍			本圃:3回以内		
					苗床:4回以内		
灰色かび病	1500倍	本圃:3回以内					
		苗床:4回以内					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000倍			本圃:3回以内		
				苗床:4回以内			
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500倍		収穫14日前 まで	3回以内		4回以内(灌注は1 回以内、散布は3 回以内)
	根腐病	1500～4000倍					
		500倍	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m ²)			定植前	

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による) もち病	2000倍	100～ 400L/10a	摘採14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
エンダイブ	菌核病 すそ枯病		100～ 300L/10a	収穫21日前 まで	1回		1回
らっきょう	さび病			収穫3日前 まで	3回以内		3回以内
パセリ	うどんこ病			収穫45日前 まで	1回		4回以内 (粒剤は3回以内、 水和剤は1回以 内)
みつば	灰色かび病			収穫14日前ま で 但し、伏せ 込み栽培は伏 せ込み前まで			1回
みょうが (花穂)	紋枯病			3L/m ²	収穫3日前 まで	2回以内	土壌灌注
みょうが (茎葉)			みょうが(花 穂)の収穫3日 前まで 但し、 花穂を収穫し ない場合に あつては開 花期終了まで				
しそ	斑点病		100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	2回以内
	さび病						
クレソン	斑点病		100～ 300L/10a	収穫21日前 まで	3回以内	散布	3回以内
だいこん	白さび病 ワッカ症	収穫14日前 まで		4回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は3回以 内)			

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	
せり	葉枯病	2000倍	100～300L/10a		4回以内	散布	5回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は4回以内)	
あずき	さび病		60～200L/10a		収穫7日前まで		3回以内	3回以内
	炭疽病							
いんげんまめ								
葉ごぼう	うどんこ病				収穫21日前まで		1回	1回
こおにたびらこ	菌核病				収穫30日前まで		1回	1回
ははこぐさ								
ズッキーニ	うどんこ病						4回以内	4回以内
オクラ					収穫前日まで		2回以内	6回以内 (全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内)
							4回以内	4回以内 (粒剤は3回以内)
ピーマン	灰色かび病							
畑わさび	白さび病		100～300L/10a		収穫7日前まで		2回以内	2回以内
わさび					畑育苗期			
かぶ								
	白斑病					3回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)		
さやいんげん	灰色かび病 菌核病							
さやえんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病			収穫前日まで	3回以内	3回以内		

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数		
実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
セルリー	斑点病			収穫3日前まで	4回以内		4回以内		
未成熟 そらまめ	さび病			3回以内	3回以内		3回以内		
モロヘイヤ	灰色かび病 黒星病			収穫前日まで	4回以内		4回以内		
ばれいしょ	夏疫病 疫病	3000～4000倍	—	収穫7日前まで	3回以内	種いも瞬間浸漬 植溝内土壌散布	5回以内 (種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内)		
	黒あざ病	500倍		20L/10a	植付前			1回	
		100～200倍			植付時				
ばれいしょ	銀か病	100倍							
やまのいも	葉渋病 炭疽病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
さといも	疫病			収穫14日前まで					
せんぶり	さび病			収穫7日前まで					
みしまさいこ	炭疽病			収穫21日前まで	4回以内		4回以内		
しゅんぎく				収穫前日まで	2回以内		2回以内		
食用ぎく	白さび病			2000～3000倍	100～180L/10a		発病初期	5回以内	5回以内
きく									
たばこ	菌核病			2000～3000倍	100～180L/10a		収穫10日前まで	2回以内	2回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)
	赤星病								