

殺虫剤

名称: アクター粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	
きゅうり	—	アブラムシ類 コナジラミ類 トマトハモグリバエ	株当たり1g	定植時	1回	植穴処理	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
なす		ミナミキイロアザミウマ マメハモグリバエ コナジラミ類 コガネムシ類幼虫						
		株当たり2g	育苗期後半	株元散布				
トマト		アブラムシ類				株当たり1g		定植時
		コナジラミ類						
ミニトマト		ハモグリバエ類	株当たり1~2g	育苗期後半		株元散布		3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は2回以内)
		コナジラミ類						

殺虫剤

名称: アクタラ粒剤5
種類: チアトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数	
ピーマン	—	ミナミキイロアザミウマ	株当り2g	定植時	1回	植穴処理	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
		アブラムシ類						
とうがらし類		アブラムシ類	株当り1g	定植時	1回	植穴処理	4回以内(定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)	
カリフラワー		アブラムシ類	株当り0.5g	育苗期後半				株元散布
ブロッコリー		アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ	株当り2g			散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	
キャベツ		アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り30g	株当り1~2g				株元散布
		アブラムシ類	株当り2g	定植時		植穴処理		
		アブラムシ類	苗地床1㎡当り6g	は種前		全面土壌混和		
		アブラムシ類	ハイマダラノメイガ	株当り2g		定植時		植穴処理
		アオムシ	育苗期後半			株元散布		
	アオムシ	コナガ	培土1L当り15g	は種前		床土混和		
はくさい	アオムシ	株当り2g	育苗期後半	株元散布				
	コナガ	培土1L当り15g	は種前	床土混和				
	アブラムシ類	株当り1~2g	育苗期後半	株元散布				

殺虫剤

名称: アクタラ粒剤5
種類: チアトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
だいこん	—	アブラムシ類	4kg/10a	は種時	1回	作条混和	3回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)
すいか			株当り2g	定植時		植穴処理	4回以内(定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)
いちご			株当り1g		2回以内		4回以内(定植時の植穴処理は2回以内、散布は2回以内)
メロン		ハモグリバエ類	株当り2g		1回	株元散布	4回以内(種子への処理及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
		アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	株当り1g				
レタス		アブラムシ類	株当り0.5g	育苗期後半	1回	床土混和	3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内)
		ナモグリバエ	培土1L当り15g	は種前			
非結球レタス		アブラムシ類	株当り0.5g	育苗期後半	1回	株元散布	1回
		ナモグリバエ	培土1L当り15g	は種前			
やまのいも		ナガイモコガ	6kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)
	アブラムシ類	萌芽期		株元散布			

殺虫剤

名称: アクタラ粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	
かんしょ	—	アブラムシ類	6kg/10a	育苗期	1回	株元散布	1回	
		コガネムシ類 幼虫	6~9kg/10a	植付前		作条混和		
全面土壌混和								
さといも		アブラムシ類	6kg/10a	植付時		作条混和	4回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は3回以内)	
ばれいしょ		アブラムシ類	2~6kg/10a					
ねぎ		ネギアザミウマ	6kg/10a	は種時			植付時	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
		ネギハモグリバエ	6~9kg/10a					
わけぎ		ネギアザミウマ	6kg/10a	植付時			作条混和	4回以内(植付時の作条混和は1回以内、植付後は3回以内)
あさつき		ネギハモグリバエ						
のざわな こまつな		アブラムシ類	6kg/10a	は種時				3回以内(は種時の作条混和は1回以内、は種後は2回以内)

殺虫剤

名称: アクトラ粒剤5
種類: チアトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
チンゲンサイ	—	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1回	作条混和	3回以内(定植時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)
		ハモグリバエ類					
ほうれんそう		アブラムシ類		は種時			3回以内(種子への処理及びは種時の作条混和は合計1回以内、散布は2回以内)
せり	水田		3kg/10a	親株養成期 但し、収穫100 日前まで		湛水散布	1回
セルリー		ナモグリバエ	株当り2g	鉢上時 定植時		土壌混和 植穴処理	2回以内(鉢上時の土壌混和は1回以内、定植時の植穴処理は1回以内)
かんきつ (苗木)	—	ミカンハモグリガ	樹当り20~40g	育苗期	2回以内	株元散布	3回以内
		コナカイガラムシ類	樹当り20g				
		ミカンキジラミ					
れんこん		クワイクビレア ブラムシ		収穫14日前 まで	3回以内	湛水散布	
こんにやく		アブラムシ類	6kg/10a	培土時(但し、 出芽前まで)	1回	株元散布	1回
にんじん	コガネムシ類 幼虫	は種時					
かぶ	アブラムシ類			全面土壌混和			

殺虫剤

名称: アクトラ粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
しゅんぎく	—	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	作条混和	4回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内)
		ハモグリバエ類					
つつじ類		コガネムシ類 幼虫	9kg/10a	生育期		株元散布	5回以内
		つつじグンバイ	6~9kg/10a	植付時			
げっきつ		ミカンキジラミ		樹当り40g		生育期	
花き類・ 観葉植物		アブラムシ類	6kg/10a			1回	6回以内