

殺虫剤

 名称:エンセダン乳剤
 種類:プロフェノホス乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフェノホスを含む農薬の総使用回数		
ばれいしよ	ヨトウムシ	1500倍	収穫7日前まで	6回以内	散布	6回以内		
	テントウムシダマシ							
	アブラムシ類							
かんしよ	ナカジロシタバ	1500倍	-	3回以内		散布	3回以内	
	ハスモンヨトウ							
てんさい	ヨトウムシ	1500倍	収穫14日前まで	3回以内			散布	3回以内
	カメノコハマシ							
	ナミハダニ							
茶	チャノコカクモンハマキ	1000~1500倍	最終摘採後~ 萌芽前まで 但し、摘採60 日前まで	1回	散布			1回
	チャハマキ							
	チャノキイロアザミウマ							
	チャノホソガ							
	チャノミドリヒメヨコバイ	1000倍				散布	1回	
	カンザワハダニ							
	ヨモギエダシャク							
	チャノホコリダニ							
つばき類	チャドクガ	1500倍	-	4回以内	散布		4回以内	
ガーベラ	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	-	6回以内			6回以内	