

殺虫殺菌剤

名称: クルーザーMAXX
種類: チアマトキサム・フルジオキシニル・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	チアマトキサ ムを含む農薬 の総使用回数	フルジオキシ ニルを含む農 薬の総使用回 数	メタラキシル 及びメタラキ シルMを含む 農薬の総使用 回数
あずき	アブラムシ類 タネバエ 茎疫病	原液	乾燥種子 1kg当り 8mL	は種前	1回	塗沫処理	1回	1回	4回以内 (種子粉衣及 びは種前の塗 沫処理は合計 1回以内、は 種後は3回以 内)
だいず	アブラムシ類 タネバエ ネキリムシ類 フタスジヒメハムシ 茎疫病						1回		
えだまめ	リゾクトニア根腐病 苗立枯病 (ピシウム菌) 紫斑病 黒根腐病						3回以内(は種 前の塗沫処理 は1回以内、 は種後は2回 以内)		
いんげんま め	苗立枯病 (ピシウム菌) リゾクトニア根腐病 アブラムシ類 タネバエ							4回以内 (種子への処 理は1回以 内、散布は3 回以内)	

殺虫殺菌剤

名称:クルーザーMAXX
種類:チアトキサム・フルジオキソニル・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	使用目的	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チアトキサムを含む農薬 の総使用回 数	フルジオキソ ニルを含む農 薬の総使用 回数	メタラキシル 及びメタラキ シルMを含む 農薬の総使 用回数
だいず	ハト、キジ バトによる 種子食害 忌避	原液	乾燥種子 1kg当り 8mL	は種前	1回	塗沫処理	3回以内 (は種前の塗 沫処理は1回 以内、は種後 は2回以内)	1回	4回以内 (種子粉衣及 びは種前の塗 沫処理は合 計1回以内、 は種後は3回 以内)
えだまめ								4回以内 (は種前の塗 沫処理は1回 以内、は種後 は3回以内)	1回