

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアメキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメキサムを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	3000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内(定植 時までの処理 は1回以内、散 布は3回以内)		
	ミカンキイロア ザミウマ	2000倍						2回以内	3回以内(育苗 期の株元散布 及び定植時の 植穴処理は合 計1回以内、散 布は2回以内)
トマト	コナジラミ類								
ミニトマト		ミナミキイロア ザミウマ						3000倍	3回以内
すいか	アブラムシ類								
	なす	コナジラミ類						ミナミキイロア ザミウマ マメハモグリバ エ テントウムシダ マシ類	3回以内
にがうり	ワタアブラムシ	3000倍		収穫7日前 まで	3回以内				
ピーマン	ミナミキイロア ザミウマ			3000倍	収穫前日 まで		4回以内(定植 時までの処理 は1回以内、散 布は3回以内)		
	アブラムシ類								
	コナカイガラム シ類 マメハモグリバ エ								

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
とうがらし類 (ししとうを除く)	アブラムシ類	3000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内(定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)
ししとう	コナカイガラムシ類 マメハモグリバエ						
キャベツ	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫3日前 まで			4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3～4L)当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注	
3000倍		100～ 300L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布		
はくさい		100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3～4L)当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注	
		2000倍		収穫7日前 まで	2回以内	散布	
レタス					3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内)		
だいこん		100～ 300L/10a			3回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)		
かぶ		3000倍		収穫前日 まで	3回以内	4回以内(は種時の全面土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	100~150倍	20L/10a	植付時	1回	植溝内土壌散布	4回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は3回以内)
		750倍	25L/10a				
	3000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで				
テントウムシダマシ類	2000倍			3回以内	4回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内)		
ナストビハムシ							
しゅんぎく		アブラムシ類	2000倍			3回以内	4回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内)
	ナモグリバエ						
実えんどう	アブラムシ類	3000倍	100~300L/10a	収穫開始7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)
さやいんげん				収穫前日まで			
いんげんまめ							
えだまめ だいず	カメムシ類	3000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)
	アブラムシ類						
ねぎ	ネギアザミウマ	1000~2000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
わけぎ	ネギハモグリバエ	2000倍					
ブロッコリー	アブラムシ類	3000倍					

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	アブラムシ類	2000~3000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、ケール、チンゲンサイを除く)		2000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
チンゲンサイ		3000倍					3回以内(定植時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)
うこぎ							2回以内
こまつな							3回以内(は種時の作条混和は1回以内、は種後は2回以内)
ほうれんそう		2000倍					3回以内(種子への処理及びは種時の作条混和は合計1回以内、散布は2回以内)
エンサイ				収穫14日前まで	3回以内		3回以内

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
みょうが (花穂)	コナカイガラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	3回以内
みょうが (茎葉)				みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで			
もも	アブラムシ類	3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	モモハモグリガ	2000～3000倍					
	シンクイムシ類 ミカンキイロアザミウマ カメムシ類	2000倍					
ネクタリン	アブラムシ類	3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	モモハモグリガ	2000～3000倍					
	シンクイムシ類 ミカンキイロアザミウマ カメムシ類	2000倍					
メロン	アブラムシ類	3000倍	150～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(種子への処理及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍					

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ成虫	4000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	3000倍					
	コナカイガラムシ類	2000～3000倍					
	ミカンハモグリガ						
	コアオハナムグリ						
	ケシキスイ類						
	アザミウマ類	2000倍					
ロウムシ類							
カメムシ類							
ミカンバエ							
ミカンキジラミ							
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	10倍	樹当り10～100mL	春芽・夏芽又は秋芽の発生前		主幹部に吹きつけ	
	アブラムシ類	25倍	樹当り20～100mL				
	ゴマダラカミキリ						
りんご	アブラムシ類	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ギンモンハモグリガ						
	キンモンホソガ						
	コナカイガラムシ類						
	シンクイムシ類	2000倍					
カメムシ類							
リンゴワタムシ	3000倍						

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数	
なし	シンクイムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	コナカイガラムシ類							
	カメムシ類							
小粒核果類 (うめを除く)	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内
	うめ	2000～3000倍						
ぶどう	カメムシ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内
	コナカイガラムシ類							
おとう	チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍		収穫前日まで	3回以内			3回以内
	フタテンヒメヨコバイ							
いちじく	オウトウショウジョウバエ	2000倍		定植前	1回			100～300L/10a
	カメムシ類							
かき	アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
	カメムシ類							
てんさい	コナカイガラムシ類	100～200倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
	カキノヘタムシガ							
	テンサイトビハムシ						50～200倍	
	カメノコハムシ						50倍	
てんさい	テンサイモグリハナバエ	100～200倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
	アブラムシ類	100倍						

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数	
モロヘイヤ	ネギアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
オクラ 食用へちま	アブラムシ類			100～300L/10a				収穫前日まで
バナナ	バナナツヤオサゾウムシ		200～700L/10a	収穫7日前まで				2回以内
マンゴー	アザミウマ類			収穫14日前まで				
アセロラ	アブラムシ類			収穫7日前まで				
グアバ (果実)	バンジロウツノエグリヒメハマキ		100～300L/10a	収穫21日前まで	3回以内			3回以内
セージ	コナジラミ類			収穫14日前まで				
にら	ネギアザミウマ		3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで			2回以内
未成熟とうもろこし	アブラムシ類							
しそ		3回以内			4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)			
やまのいも								
アスパラガス	ネギアザミウマ	2000倍	200～400L/10a	収穫前日まで	1回	3回以内		
茶	チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍		摘採7日前まで				
	チャノミドリヒメヨコバイ							
	コミカンアブラムシ ツマグロアオカスミカメ	3000倍						



## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物 (宿根アスター、トルコギキョウ、きくを除く)	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	ハモグリバエ類	2000倍					
宿根アスター	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
	コナジラミ類						
トルコギキョウ	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
	コナジラミ類						
きく	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
つつじ類	ツツジゲンバイ			200～400L/10a		5回以内	5回以内

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
きく	ミカンキイロアザミウマ ウスモンミドリカスミカメ	300g/10a	300～1000L/10a	発生初期	6回以内	灌水チューブを用いた灌注処理	6回以内