

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	3000倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)		
	ミカンキイロア ザミウマ	2000倍						2回以内	3回以内
トマト	コナジラミ類								
ミニトマト	コナジラミ類	2000倍			2回以内		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)	
すいか	ミナミキイロア ザミウマ	3000倍			3回以内		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)	
	アブラムシ類 コナジラミ類								
なす	ミナミキイロア ザミウマ	2000倍			3回以内		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)	
	マメハモグリバ エ								
	テントウムシダ マシ類								
にがうり	ワタアブラムシ						収穫7日前 まで	3回以内	
ピーマン	ミナミキイロア ザミウマ	3000倍	3回以内	収穫前日 まで	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)				
	アブラムシ類 コナカイガラム シ類								
	マメハモグリバ エ								

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
とうがらし類 (ししとうを除く)	アブラムシ類	3000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)
ししとう	コナカイガラムシ類 マメハモグリバエ						
キャベツ	アブラムシ類	2000~3000倍		収穫3日前まで			4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注	
はくさい	アブラムシ類	3000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注	
レタス		2000倍		収穫7日前まで	2回以内		3回以内 (種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内)
だいこん			100~300L /10a			散布	3回以内 (は種時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)
かぶ		3000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 (は種時の全面土壌混和は1回以内、散布は3回以内)

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキシサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキシサムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	100倍	10~20L /10a	植付時	1回	植溝内土壌散布	4回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は3回以内)
		100~150倍	20L/10a				
		750倍	25L/10a				
	3000倍	100~300L /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布		
テントウムシダマシ類							
ナストビハムシ							
アブラムシ類	2000倍					しゅんぎく	ナモグリバエ
実えんどう		収穫開始7日前まで	3回以内				
さやいんげん	アブラムシ類	収穫前日まで					
いんげんまめ	3000倍	えだまめ だいず	カメムシ類 アブラムシ類	収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)	
ねぎ							ネギアザミウマ
わけぎ	ネギハモグリバエ	2000倍	4回以内 (植付時の作条混和は1回以内、植付後は3回以内)				
ブロッコリー	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)		

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	アブラムシ類	2000 ~3000倍	100~300L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元散布 は1回以内、散布は 3回以内)
非結球あぶら な科葉菜類(こ まつな、ケール、 チンゲンサイを除く)		2000倍					2回以内
チンゲンサイ				3回以内 (定植時の作条混和 は1回以内、散布は 2回以内)			
うこぎ		3000倍		2回以内			
こまつな				3回以内 (は種時の作条混和 は1回以内、は種後 は2回以内)			
ほうれんそう		2000倍		3回以内 (種子への処理及び は種時の作条混和 は合計1回以内、散 布は2回以内)			
エンサイ				収穫14日前 まで			
みょうが (花穂)	コナカイガラム シ類	2000倍	100~300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布、但し花穂 の発生期には マルチフィルム 被覆により散 布液が直接花 穂に飛散しな い状態で使用 する	3回以内
みょうが (茎葉)				みょうが(花 穂)の収穫前 日まで 但 し、花穂を収 穫しない場 合にあつて は開花期終 了まで	散布		

## 殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
もも ネクタリン	アブラムシ類	3000倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで			3回以内
	モモハモグリ ガ	2000 ～3000倍					
	シンクイムシ類	2000倍					
	ミカンキイロア ザミウマ カメムシ類						
メロン	ミナミキイロア ザミウマ	150～ 300L/10a				4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)	
	トマトハモグリ バエ						
かんきつ	アブラムシ類	3000倍	200～ 700L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	コナカイガラム シ類	2000～3000倍					
	ミカンハモグリ ガ						
	コアオハナム グリ						
	ケシキスイ類						
	ミカンバエ成虫	2000倍					
	アザミウマ類						
	ロウムシ類						
カメムシ類							
ミカンバエ幼虫	4000倍						
ミカンキジラミ							
ゴマダラカミキ リ成虫							
かんきつ (苗木)	ミカンハモグリ ガ	10倍	樹当り10～ 100mL	春芽・夏芽又 は秋芽の発 生前		主幹部に吹き つけ	
	アブラムシ類	25倍	樹当り20～ 100mL				
	ゴマダラカミキ リ						

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキシサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキシサムを含む農薬の総使用回数	
りんご	アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ コナカイガラムシ類	2000~3000倍	200~700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	シンクイムシ類 カメムシ類	2000倍						
	リンゴワタムシ	3000倍						
なし	シンクイムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類	2000倍		収穫前日まで	3回以内			3回以内
	チュウゴクナシキジラミ	3000倍						
	アブラムシ類	2000倍						
小粒核果類 (うめを除く)	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内
うめ	カメムシ類	2000~3000倍						
	コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	2000倍						
ぶどう	フタテンヒメヨコバイ	2000~3000倍		収穫前日まで	2回以内			2回以内
	オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2000倍						
いちじく	アザミウマ類							

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数			
かき	アザミウマ類	2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内			
	カメムシ類									
	コナカイガラムシ類									
	カキノヘタムシガ									
てんさい	テンサイトビハムシ	50～200倍	ペーパーポット1冊当り1L (3L/m <sup>2</sup> )	定植前	1回	苗床灌注	5回以内 (種子への処理は1回以内、苗床灌注は1回以内、散布は3回以内)			
	カメノコハムシ	50倍								
	テンサイモグリハナバエ	100～200倍								
		100倍								
	アブラムシ類	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内					
モロヘイヤ	ネギアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内			
オクラ 食用へちま	アブラムシ類		100～300L/10a	収穫前日まで						
バナナ	バナナツヤオサゾウムシ			収穫7日前まで				2回以内	散布	2回以内
マンゴー	アザミウマ類		200～700L/10a	収穫14日前まで						
アセロラ	アブラムシ類			収穫7日前まで						
グアバ (果実)	バンジロウツノエグリヒメハマキ									
セージ	コナジラミ類		100～300L/10a	収穫21日前まで				3回以内	3回以内	
にら	ネギアザミウマ	収穫14日前まで								

## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (は種前の塗沫処理 は1回以内、は種後 は2回以内)
しそ							2回以内
やまのいも							4回以内 (粒剤の処理は1回 以内、散布は3回以 内)
アスパラガス	ネギアザミウ マ	2000倍		収穫前日 まで	3回以内		3回以内
茶	チャノキイロア ザミウマ						
	チャノミドリヒメ ヨコバイ	2000～3000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	1回		1回
	コミカンアブラ ムシ	3000倍					
ツマグロアオカ スミカメ							



## 殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤  
種類: チアメトキサム水溶剤

### 適用の範囲と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物 (宿根アスター、トルコギキョウ、きくを除く)	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	ハモグリバエ類	2000倍					
宿根アスター	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍					
トルコギキョウ	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍					
きく	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
つつじ類	ツツジグンバイ		200～400L/10a		5回以内		5回以内

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
きく	ミカンキイロアザミウマ ウスモンミドリカスミカメ	300g/10a	300～1000L/10a	発生初期	6回以内	灌水チューブを用いた灌注処理	6回以内