

殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数				
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	3000倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)				
	ミカンキイロア ザミウマ	2000倍						2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の植穴 処理は合計1回以 内、散布は2回以 内)		
トマト	3000倍									3回以内 (定植時の植穴処理 は1回以内、散布は 3回以内)	
ミニトマト		コナジラミ類			2000倍		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)			
すいか	ミナミキイロア ザミウマ	3000倍							3回以内	3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)
	アブラムシ類				2000倍		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)			
なす	コナジラミ類	2000倍							3回以内	3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)
	ミナミキイロア ザミウマ				2000倍		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)			
	マメハモグリバ エ テントウムシダ マシ類										
にがうり	ワタアブラムシ	3000倍			3回以内		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)			
ピーマン	ミナミキイロア ザミウマ		3000倍	3回以内		3回以内			4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)		
	アブラムシ類	3000倍			3回以内		4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)				
	コナカイガラム シ類 マメハモグリバ エ							3000倍		3回以内	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
とうがらし類 (ししとうを除く)	アブラムシ類	3000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)
ししとう	コナカイガラムシ類 マメハモグリバエ						
キャベツ	アブラムシ類			2000~3000倍		収穫3日前まで	
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注	
はくさい	アブラムシ類	3000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注	
レタス	アブラムシ類	2000倍	100~300L /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内)
だいこん							3回以内 (は種時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)
かぶ							4回以内 (は種時の全面土壌混和は1回以内、散布は3回以内)

殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	100倍	10~20L /10a	植付時	1回	植溝内土壌散布	4回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は3回以内)
		100~150倍	20L/10a				
		750倍	25L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	
		3000倍					
	テントウムシダマシ類 ナストビハムシ						
しゅんぎく	アブラムシ類	2000倍					4回以内 (は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内)
	ナモグリバエ						
実えんどう	アブラムシ類	3000倍	100~300L /10a	収穫開始7日前まで	2回以内	散布	3回以内
さやいんげん				収穫前日まで			
いんげんまめ							
えだまめ だいず	カメムシ類 アブラムシ類			収穫7日前まで			3回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)
ねぎ	ネギアザミウマ	1000~2000倍		収穫3日前まで	3回以内		4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
わけぎ	ネギハモグリバエ	2000倍					
ブロッコリー	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで			4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	アブラムシ類	2000 ~3000倍	100~300L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元散布 は1回以内、散布は 3回以内)
非結球あぶら な科葉菜類(こ まつな、ケール、チンゲン サイを除く)		2000倍			2回以内		
チンゲンサイ				3回以内 (定植時の作条混和 は1回以内、散布は 2回以内)			
うこぎ		3000倍		2回以内			
こまつな				3回以内 (は種時の作条混和 は1回以内、は種後 は2回以内)			
ほうれんそう		2000倍		3回以内 (種子への処理及び は種時の作条混和 は合計1回以内、散 布は2回以内)			
エンサイ				収穫14日前 まで			
みょうが (花穂)	コナカイガラム シ類	2000倍	100~300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布、但し花穂 の発生期には マルチフィルム 被覆により散 布液が直接花 穂に飛散しな い状態で使用 する	3回以内
みょうが (茎葉)				みょうが(花 穂)の収穫前 日まで 但 し、花穂を収 穫しない場 合にあつては 開花期終了 まで			

殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
もも ネクタリン	アブラムシ類	3000倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで			3回以内
	モモハモグリ ガ	2000 ～3000倍					
	シンクイムシ 類	2000倍					
	ミカンキイロア ザミウマ カメムシ類						
メロン	ミナミキイロア ザミウマ		150～ 300L/10a			散布	4回以内 (定植時までの処理 は1回以内、散布は 3回以内)
	トマトハモグリ バエ						
かんきつ	アブラムシ類	3000倍	200～ 700L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	コナカイガラム シ類	2000～3000倍					
	ミカンハモグリ ガ						
	コアオハナム グリ						
	ケシキスイ類	2000倍					
	ミカンバエ成 虫						
	アザミウマ類						
	ロウムシ類						
	カメムシ類	4000倍					
ミカンバエ幼 虫							
ミカンキジラミ							
ゴマダラカミキ リ成虫							
かんきつ (苗木)	ミカンハモグリ ガ	10倍	樹当り10～ 100mL	春芽・夏芽又 は秋芽の発 生前		主幹部に吹き つけ	
	アブラムシ類	25倍	樹当り20～ 100mL				
	ゴマダラカミキ リ						

殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数			
りんご	アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ コナカイガラムシ類	2000~3000倍	200~ 700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内			
	シンクイムシ類 カメムシ類	2000倍								
	リンゴワタムシ	3000倍								
なし	シンクイムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類	2000倍		200~ 700L/10a	収穫前日まで			3回以内	散布	3回以内
	チュウゴクナシキジラミ	3000倍								
	小粒核果類(うめを除く)	アブラムシ類								
うめ		2000~3000倍		200~ 700L/10a	収穫7日前まで			2回以内	散布	2回以内
	カメムシ類									
ぶどう	コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	2000倍		200~ 700L/10a	収穫7日前まで			2回以内	散布	2回以内
	フタテンヒメヨコバイ	2000~3000倍								
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2000倍	200~ 700L/10a	収穫前日まで		散布				
	いちじく	アザミウマ類								

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
かき	アザミウマ類	2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
	カメムシ類						
	コナカイガラムシ類						
	カキノヘタムシガ						
てんさい	テンサイトビハムシ	50～200倍	ペーパーポット1冊当り1L (3L/m ²)	定植前	1回	苗床灌注	5回以内 (種子への処理は1回以内、苗床灌注は1回以内、散布は3回以内)
	カメノコハムシ	50倍					
	テンサイモグリハナバエ	100～200倍					
		100倍					
	アブラムシ類	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
モロヘイヤ	ネギアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
オクラ 食用へちま	アブラムシ類		100～300L/10a	収穫前日まで			
バナナ	バナナツヤオサゾウムシ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
マンゴー	アザミウマ類		200～700L/10a	収穫14日前まで			
アセロラ	アブラムシ類			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
グアバ (果実)	バンジロウツノエグリヒメハマキ						
セージ	コナジラミ類			100～300L/10a	収穫21日前まで	3回以内	3回以内
にら	ネギアザミウマ			収穫14日前まで			

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (は種前の塗沫処理 は1回以内、は種後 は2回以内)
しそ							2回以内
やまのいも							4回以内 (粒剤の処理は1回 以内、散布は3回以 内)
アスパラガス	ネギアザミウ マ	2000倍	収穫前日 まで	3回以内	3回以内		
茶	チャノキイロア ザミウマ	2000～3000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	1回		1回
	チャノミドリヒメ ヨコバイ						
	コミカンアブラ ムシ ツマグロアオカ スミカメ	3000倍					

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物 (宿根アスター、トルコギキョウ、きくを除く)	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	ハモグリバエ類	2000倍					
宿根アスター	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍					
トルコギキョウ	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍					
きく	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
つつじ類	ツツジグンバイ		200～400L/10a		5回以内		5回以内

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数
きく	ミカンキイロアザミウマ ウスモンミドリカスミカメ	300g/10a	300～1000L/10a	発生初期	6回以内	灌水チューブを用いた灌注処理	6回以内