

殺虫剤

 名称:サイハロン水和剤
 種類:シハロトリン水和剤

適用の範囲と使用方法

2015年10月14日 現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数					
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ モモチョッキリゾウムシ	2000倍	200~700L /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					
	キンモンホソガ アブラムシ類	2000~3000倍										
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシチビガ カメムシ類	2000倍										
	アブラムシ類	2000~3000倍										
もも	シンクイムシ類 モモハモグリガ	2000倍										
	アブラムシ類	2000~3000倍										
みかん	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 カメムシ類	2000倍						収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類	2000~3000倍						100~300L /10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
はくさい	ヨトウムシ タマナギンウワバ							収穫14日前まで				
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ							収穫21日前まで				
レタス	アブラムシ類		収穫14日前まで									
きゅうり	オンシツコナジラミ		収穫前日まで									
なす	アブラムシ類											
ばれいしょ	テントウムシダマン類		2000倍									
	アブラムシ類		2000~4000倍									

殺虫剤

名称:サイハロン水和剤
種類:シハロトリン水和剤

適用の範囲と使用方法

2015年10月14日 現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数
てんさい	ヨトウムシ	2000～4000倍	100～300L /10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ コミカンアブラムシ チャノミドリヒメコバイ ヨモギエダシヤク チャハマキ	2000倍	200～400L /10a	摘採7日前まで	1回		1回
たばこ	タバコガ ヨトウムシ	2000～3000倍	25～180L /10a	収穫10日前まで	2回以内		2回以内
芝	シバツトガ スジキリヨトウ		300mL/m ²	発生初期	3回以内		3回以内