

殺虫剤

名称:サイハロン乳剤
種類:シハロトリン乳剤

適用の範囲と使用方法

2015年10月14日 現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	アブラムシ類	3000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
		1000倍	25L/10a					
きゅうり	オンシツコナジラミ	2000倍	100～300L/10a		3回以内		3回以内	
		2000～4000倍						
すいか メロン	アブラムシ類	3000～4000倍			1回		1回	
なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2000～4000倍			3回以内		3回以内	
キャベツ	アオムシ コナガ	2000倍						収穫7日前まで
はくさい	アブラムシ類 ヨトウムシ							収穫14日前まで
	アオムシ コナガ アブラムシ類				収穫21日前まで			
てんさい	ヨトウムシ	2000～3000倍			25L/10a		4回以内	4回以内
	カメノコハマシ	750倍						
たまねぎ	ネギアザミウマ	3000倍		100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内		
小麦	アブラムシ類	4000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで				
豆類 (種実、ただし、らっかせいを除く)			100～300L/10a	収穫3日前まで				
花き類・観葉植物 (きくを除く)	オオタバコガ	100～300L/10a	-	-				
きく	アブラムシ類 オオタバコガ							