

殺虫剤

名称:サイハロン乳剤
種類:シハロトリン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数		
ばれいしょ	アブラムシ類	3000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内		
		1000倍	25L/10a						
きゅうり	オンシツコナジラミ	2000倍	100～300L/10a		3回以内		3回以内		
		2000～4000倍							
すいか メロン	アブラムシ類	3000～4000倍			1回		1回		
なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2000～4000倍			2000倍		3回以内	3回以内	
キャベツ	アオムシ コナガ								
はくさい	アブラムシ類 ヨトウムシ								
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	2000～3000倍			25L/10a		収穫21日前まで	4回以内	4回以内
てんさい	ヨトウムシ								
	たまねぎ	カメノコハムシ		750倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
ネギアザミウマ		3000倍		100～300L/10a	収穫3日前まで				
小麦	アブラムシ類	4000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	3回以内	3回以内			
豆類 (種実、ただし、らっかせいを除く)			100～300L/10a	収穫3日前まで					
花き類・観葉植物 (きくを除く)				-					
きく									