

## 除草剤

 名称:アピロキリオMX1キロ粒剤51  
 種類:ピリフタリド・プレチラクロール・ペンシルフロンメチル・メソトリオン粒剤

適用の範囲と使用方法

2012年10月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリフタリドを含む農薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数	ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	メソトリオンを含む農薬の総使用回数	
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯					
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時				田植同時散布機で施用						
直播水稻	水田一年生雑草 及び	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	埴土～埴土			湛水散布	北陸・関東・東山・東海、近畿・中国・四国					
	ホタルイ											
	ミスガヤツリ											
	セリ											

 ・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ (<http://www.syngenta.co.jp>) を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号