

除草剤

名称:シンジェンタ・ホクト1キロ粒剤
種類:シハロホップブチル・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び	移植後5日～ノビ エ3葉期 ただ し、移植後30日 まで	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域の普通期及 び早期栽培地帯
	マツバイ						
	ホタルイ						
	ウリカワ						
	ミズガヤツリ						
	ヘラオモダカ(北 海道、東北)						
	オモダカ(近畿・ 中国・四国の早 期、九州を除く)						
	ヒルムシロ						
	セリ						
	クログワイ(北海 道、近畿・中国・ 四国の早期、九 州を除く)						
エゾノサヤヌカグ サ(北海道)							
シズイ(東北)							
アオミドロ・藻類 による表層はく 離							
シハロホップブチルを含む農薬の 総使用回	ジメタメトリンを含む農薬の総使用 回数	ピラゾスルフロンエチルを含む農 薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総 使用回数				
3回以内	2回以内	1回	2回以内				

・ 使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号