

除草剤

名称:シンジェンタ・ホクト粒剤
種類:シハロホップブチル・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤

適用雑草の範囲及び使用方法

2007年6月20日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ へらオモダカ(北海道、東北) オモダカ(東北) ヒルムシロ セリ クログワイ(北海道を除く) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植後5日～ノ ビエ3葉期 ただ し、移植後30日 まで	壤土～埴土	3kg/10a	1回	湛水散布	全域の普通期 及び早期栽培地 帯

シハロホップブチルを含む農薬の 総使用回数	ジメタメトリンを含む農薬の総使用 回数	ピラゾスルフロンエチルを含む農 薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総 使用回数
3回以内	2回以内	1回	2回以内

・ 使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号