

殺菌剤

名称:スコア顆粒水和剤
種類:ジフェノコナゾール水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数																	
りんご	黒星病 赤星病	3000~4000倍	200~ 700L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内																	
	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	3000倍																						
	モニリア病 褐斑病	2000~3000倍																						
なし	黒星病 赤星病	4000倍		200~ 700L/10a					3回以内	散布	3回以内													
	輪紋病 黒斑病	2000倍																						
かき	うどんこ病 炭疽病 落葉病	3000倍						200~ 700L/10a					3回以内	散布	3回以内									
おうとう	灰星病	2000倍																						
もも												黒星病												
ネクタリン	灰星病 黒星病											2000倍					2回以内	散布	2回以内					
すもも	灰星病																							
あんず																								
うめ	黒星病															2000~3000倍				200~ 700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	すす斑病															3000倍								
びわ	灰斑病		4000倍			3回以内	散布									3回以内								
マルメロ	ごま色斑点病		2000倍																		収穫7日前 まで			

殺菌剤

名称:スコア顆粒水和剤
種類:ジフェノコナゾール水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数	
メロン	つる枯病 うどんこ病	2000倍	200～ 400L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
すいか	つる枯病 うどんこ病 炭疽病							
トマト	葉かび病 すすかび病							
きゅうり	うどんこ病 黒星病							
かぼちゃ	うどんこ病			収穫3日前 まで				
いちご ピーマン				収穫前日 まで				
なす								すすかび病
セルリー	斑点病			2回以内				収穫14日前 まで
パセリ	うどんこ病							摘採7日前 まで
茶	炭疽病 もち病 網もち病 褐色円星病							