

## 殺菌剤

名称: スコア顆粒水和剤  
種類: ジフェノコナゾール水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年3月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数			
りんご	黒星病 赤星病	3000~4000倍	200~ 700L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内			
	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	3000倍								
	モニリア病 褐斑病	2000~3000倍								
	なし	黒星病 赤星病 輪紋病 黒斑病						4000倍 2000倍		
かき	うどんこ病 炭疽病 落葉病	3000倍		収穫前日 まで				2回以内	散布	2回以内
おうとう	灰星病	2000倍								
もも	黒星病									
ネクタリン	灰星病 黒星病									
すもも	灰星病									
あんず										
うめ	黒星病			2000~3000倍				3回以内	3回以内	散布
	すす斑病	3000倍								
びわ	灰斑病	4000倍	収穫21日前 まで	3回以内	散布	3回以内				
マルメロ	ごま色斑点病	2000倍	収穫7日前 まで							

## 殺菌剤

名称:スコア顆粒水和剤  
種類:ジフェノコナゾール水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年3月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数			
メロン	つる枯病 うどんこ病	2000倍	200~400L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内			
すいか	つる枯病 うどんこ病 炭疽病									
トマト	葉かび病 すすかび病									
きゅうり	うどんこ病 黒星病									
かぼちゃ	うどんこ病							収穫3日前 まで		
いちご ピーマン				収穫前日 まで						
なす					すすかび病					
セルリー	斑点病			2000倍	200~400L /10a			収穫3日前 まで	2回以内	2回以内
しょうが	白星病									
パセリ	うどんこ病									
茶	炭疽病 もち病 網もち病 褐色円星病			2000倍	200~400L /10a			摘採7日前 まで	2回以内	2回以内