

殺菌剤

名称:スコア顆粒水和剤
種類:ジフェノコナゾール水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年8月29日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数																														
りんご	黒星病 赤星病	3000~4000倍	200~ 700L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内																														
	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	3000倍																																			
	モニリア病 褐斑病	2000~3000倍																																			
なし	黒星病 赤星病	2000~4000倍		200~ 700L/10a				収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内																										
	輪紋病 黒斑病	2000倍																																			
かき	うどんこ病 炭疽病 落葉病	3000倍										200~ 700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内																					
おうとう	灰星病	2000倍															200~ 700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内																
もも																						黒星病															
ネクタリン	灰星病 黒星病																					2000倍	200~ 700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内										
すもも	灰星病																																				
あんず																																					
うめ	黒星病																											2000~3000倍	200~ 700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内				
	すす斑病	3000倍																																			
びわ	灰斑病	4000倍	200~ 700L/10a		収穫21日前 まで	3回以内	散布																					3回以内									
マルメロ	ごま色斑点病	2000倍																				200~ 700L/10a												収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内

殺菌剤

名称:スコア顆粒水和剤
種類:ジフェノコナゾール水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年8月29日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数
メロン	つる枯病 うどんこ病	2000倍	200~400L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
すいか	つる枯病 うどんこ病 炭疽病						
トマト	葉かび病 すすかび病						
きゅうり	うどんこ病 黒星病						
かぼちゃ	うどんこ病			収穫3日前まで			
いちご ピーマン				収穫前日まで			
なす							
セルリー	斑点病			収穫3日前まで			
しょうが	白星病						
パセリ	うどんこ病						
茶	炭疽病 もち病 網もち病 褐色円星病		摘採7日前まで	2回以内	2回以内		