

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数			
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1000~1500倍	100~300L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)			
さやいんげん										
さやえんどう										
豆類(未成熟、 ただし、えだま め、さやいん げん、さやえん どうを除く)	灰色かび病	1000倍		収穫前日 まで			3回以内	散布	4回以内 (は種前の塗沫処理は 1回以内、は種後は3回 以内)	
えだまめ										赤かび病
きゅうり	灰色かび病 菌核病	1000~1500倍		1000倍			収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	褐斑病									
すいか	菌核病	1000倍		1000~1500倍			4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)	3回以内	散布	3回以内
トマト	灰色かび病									
ミニトマト										
ピーマン		1000倍								
なす		1000~1500倍								
		フザリウム立 枯病	1000倍							
いちご		灰色かび病	1000~1500倍							
	炭疽病	1000倍								
ねぎ	小菌核腐敗病	1000倍								

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数		
たまねぎ	灰色かび病	1000~1500倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植前は1回以内、定植後は3回以内)		
	小菌核病	1500倍							
	灰色腐敗病	500倍	-	定植直前	1回	5分間セル苗浸漬			
		500~1000倍				5分間苗根部浸漬			
ばれいしょ	そうか病	200倍		植付前		種いも瞬間浸漬	1回		
キャベツ	菌核病 株腐病	1000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布は3回以内)		
らっきょう	灰色かび病	1000~1500倍		収穫前日まで				3回以内	
しそ	菌核病	1500倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内	
にら	白斑葉枯病	2000倍			1回			1回	
にんにく					3回以内			3回以内	
ふき	灰色かび病	1000倍		収穫前日まで	2回以内			2回以内	
にんじん	菌核病				3回以内			3回以内	
メロン									
ぶどう	晩腐病	1000~2000倍		200~700L /10a	収穫21日前まで			3回以内	3回以内
食用ぎく	灰色かび病	1000倍		100~300L /10a	収穫3日前まで			2回以内	2回以内
食用金魚草		1500倍	収穫7日前まで						
花き類・観葉植物		1000倍	発病前~発病初期		4回以内	4回以内			