

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数			
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1000~1500倍	100~300L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)			
さやいんげん										
さやえんどう										
豆類(未成熟、 ただし、えだま め、さやいん げん、さやえん どうを除く)	灰色かび病	1000倍		収穫前日 まで			3回以内	散布	4回以内 (は種前の塗沫処理は 1回以内、は種後は3回 以内)	
えだまめ										赤かび病
きゅうり	灰色かび病 菌核病	1000~1500倍		1000倍			収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	褐斑病									
すいか	菌核病	1000倍		1000~1500倍			収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)
トマト										
ミニトマト	灰色かび病									
ピーマン	1000倍									
なす	1000~1500倍									
	フザリウム立 枯病	1000倍								
いちご	灰色かび病	1000~1500倍	1000倍		収穫前日 まで	3回以内				
	炭疽病									
ねぎ	小菌核腐敗病	1000倍	1000倍	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)			

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20
種類：フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色かび病	1000～1500倍	100～300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植前は1回以内、定植後は3回以内)
	小菌核病	1500倍					
	灰色腐敗病	500倍	-	定植直前	1回	5分間セル苗浸漬	
		500～1000倍				5分間苗根部浸漬	
ばれいしょ	そうか病	200倍		植付前		種いも瞬間浸漬	1回
キャベツ	菌核病 株腐病	1000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布は3回以内)
らっきょう	灰色かび病	1000～1500倍		収穫前日まで			
しそ	菌核病	1500倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
にら	白斑葉枯病	2000倍			1回		1回
にんにく					3回以内		3回以内
ふき					灰色かび病		2回以内
にんじん	菌核病	1000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
メロン					3回以内		3回以内
食用金魚草	灰色かび病	1500倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
花き類・観葉植物		1000倍		発病前～発病初期	4回以内		4回以内