

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20
種類：フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年9月21日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数						
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1000～1500倍	100～300L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)						
さやいんげん													
さやえんどう													
豆類(未成熟、 ただし、えだま め、さやいん げん、さやえん どうを除く)	灰色かび病	1000倍		収穫前日 まで			3回以内	散布	4回以内 (は種前の塗沫処理は 1回以内、は種後は3回 以内)				
えだまめ	赤かび病												
きゅうり	灰色かび病 菌核病	1000～1500倍											
	褐斑病	1000倍		すいか			菌核病 炭疽病	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)			
トマト	灰色かび病	1000～1500倍		100～300L /10a			収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)			
ミニトマト													
なす			フザリウム立 枯病		1000倍	ピーマン					灰色かび病 炭疽病	3回以内	
らっきょう	灰色かび病	1000～1500倍	100～300L /10a		収穫前日 まで	3回以内	散布			4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)			
いちご											炭疽病		
ねぎ	小菌核腐敗病 黒腐菌核病	1000倍			すいか					菌核病 炭疽病	3回以内	散布	4回以内 (は種前の塗沫処理は 1回以内、は種後は3回 以内)

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20
種類：フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年9月21日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色かび病	1000～1500倍	100～300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植前は1回以内、定植後は3回以内)
	小菌核病	1500倍					
	灰色腐敗病	500倍	-	定植直前	1回	5分間セル苗浸漬	
		500～1000倍				5分間苗根部浸漬	
ばれいしょ	そうか病	200倍		植付前		種いも瞬間浸漬	1回
キャベツ	菌核病 株腐病	1000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布は3回以内)
にんにく	白斑葉枯病	2000倍		収穫7日前まで			1回
にら			1回				
ふき	灰色かび病	1000倍	200～700L /10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内
オリーブ	炭疽病			収穫60日前まで			
オリーブ(葉)							
わけぎ	小菌核腐敗病			収穫3日前まで	3回以内	3回以内	
しそ	菌核病	1500倍	100～300L /10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
にんじん		1000倍		収穫3日前まで	3回以内	3回以内	
ブロッコリー				収穫前日まで			
メロン							
マンゴー	炭疽病			200～700L /10a	収穫21日前まで		
ぶどう	白腐病	1000～2000倍	200～700L /10a	収穫21日前まで	3回以内	3回以内	
	晩腐病						
	灰色かび病						

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年9月21日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
食用ぎく	灰色かび病	1000倍	100~300L /10a	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内
食用金魚草		1500倍					
花き類・ 観葉植物		1000倍		発病前 ~発病初期	4回以内		4回以内