

除草剤

名称:ソルネット1キロ粒剤
種類:プレチラクロール粒剤

適用の範囲と使用方法

2014年6月25日現在

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | プレチラクロールを 含む農薬の 総使用回数 |
|------|---|--------------------------|------------|---------|---------|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ(近畿・中国・四国、九州を除く) ミズガヤツリ(近畿・中国・四国、九州を除く) | 植代後 ～移植前7日 | 砂壤土 ～埴土 | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布 | 北海道、東北、北陸 | 2回以内 |
| | | | 壤土～埴土 | | | | 関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯 | |
| | | 移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで | 砂壤土 ～埴土 | | | | 全域(近畿・中国・四国、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯 | |
| | | | 壤土～埴土 | | | | 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯 | |
| | | 移植時 | 砂壤土 ～埴土 | | | | 全域(近畿・中国・四国、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯 | |
| | | | 壤土～埴土 | | | | 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯 | |