

除草剤

名称:ソルネット1キロ粒剤
種類:プレチラクロール粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ(近畿・中国・四国、九州を除く) ミズガヤツリ(近畿・中国・四国、九州を除く)	移植時	壤土～埴土	1kg/10a	1回	田植同時散布機で施用	近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯	2回以内
			砂壤土～埴土				全域(近畿・中国・四国、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	
		植代後～移植前7日	壤土～埴土			灌水散布	北海道、東北、北陸	
			砂壤土～埴土				関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯	
		移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで	壤土～埴土			灌水散布	近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯	
			砂壤土～埴土				全域(近畿・中国・四国、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	