

殺虫剤

名称: チェス顆粒水和剤
種類: ピメロジン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピメロジンを含む農薬の総使用回数								
もも	アブラムシ類	5000倍	200~700L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内								
なし				収穫21日前まで											
うめ			アブラムシ類	5000倍	200~700L /10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内						
みょうが(花穂)						収穫前日まで				3回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	3回以内			
ズッキーニ					アブラムシ類	5000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の株元散布は1回以内、散布は2回以内)				
ピーマン									3回以内		4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)				
とうがらし類							アブラムシ類	5000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内		
メロン													5回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は4回以内)		
すいか									アブラムシ類	5000倍	100~300L /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
ばれいしょ															4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
オクラ	アブラムシ類 コナジラミ類	5000倍									100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)
トマト															4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
ミニトマト			アブラムシ類 コナジラミ類	5000倍							100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)
きゅうり															4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)
なす					アブラムシ類 コナジラミ類	5000倍					100~300L /10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)
いちご															3回以内
花き類・観葉植物							アブラムシ類 コナジラミ類	5000倍			100~300L /10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内