

殺菌剤

名称: チルト乳剤25
種類: プロピコナゾール乳剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピコナゾールを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	すす紋病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
飼料用とうもろこし		8倍	800mL/10a			無人ヘリコプターによる散布	
		16倍	1600mL/10a				
小麦	赤さび病	250～500倍	25L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	5回以内 (根雪前は2回以内、春期以降は3回以内)
		1000～3000倍	60～150L/10a				
	うどんこ病	2000～3000倍				無人ヘリコプターによる散布	
	赤かび病	8倍	800mL/10a	収穫7日前まで			
	眼紋病 黒変病	1000～2000倍	60～150L/10a		収穫3日前まで	散布	
				黄斑病 葉枯症			
	なまぐさ黒穂病	750倍	60～150L/10a	小麦1～3葉期 但し、根雪前	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	
	紅色雪腐病	750～1000倍		根雪前			
	雪腐小粒菌核病	8倍					
			150倍	25L/10a			
大麦	網斑病 雲形病	1000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回
	うどんこ病	2000～3000倍					
	赤かび病	1000～2000倍				800mL/10a	
		8倍					
きく	白さび病	3000倍	100～300L/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内