

除草剤

名称: デュアールゴールド
種類: S-メトラクロール乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
とうもろこし	一年生イネ科雑草	本葉1~2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	70~ 100mL/10a	70~100L /10a	1回	全面土壌散布	北海道	1回
飼料用とうもろこし	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	70~ 130mL/10a					
かんしょ		挿苗後但し、収穫90日前まで (雑草発生前)						
		マルチ前・挿苗前 (雑草発生前)						
えだまめ (移植栽培)	一年生雑草	定植前 (雑草発生前)	70~ 130mL/10a					
えだまめ (直播栽培)		は種後出芽前 (雑草発生前)						
だいず								
らっかせい								
いんげんまめ さやいんげん						北海道 東北		
てんさい (直播栽培)	一年生イネ科雑草	は種後出芽前 期 (雑草発生前)	70~ 100mL/10a	2回以内		全域	2回以内	
てんさい (移植栽培)	一年生雑草	定植後但し、収穫90日前まで (雑草発生前)						

除草剤

名称:デュアルゴールド
種類:S-メトラクロール乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
さといも	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	70~ 130mL/10a	70~100L /10a	1回	全面土壌散布	全域	1回
キャベツ		定植直後~定植15日後まで (雑草発生前)	40~ 60mL/10a					
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	100~ 130mL/10a					
こんにゃく		植付後又は培土後萌芽前 (雑草発生前)		全域				
やまのいも		植付後萌芽前 (雑草発生前)	70~ 130mL/10a	100L/10a	全面土壌散布	北海道		
べにばないんげん		は種後出芽前 (雑草発生前)						
たदैい		一年生イネ科雑草	定植活着後又は収穫後 (雑草発生前)	100mL/10a	2回以内	全域	2回以内	