

殺虫剤

名称:トリガード液剤
種類:シロマジン液剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シロマジンを含む農薬の総使用回数	
メロン	トマトハモグリバエ	1000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
トマト	ハモグリバエ類				2回以内		2回以内	
ミニトマト					3回以内		3回以内	
なす	マメハモグリバエ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内	
セルリー					3回以内		3回以内	
しゅんぎく チンゲンサイ	ハモグリバエ類			1000 ~2000倍	収穫14日前まで		2回以内	2回以内
とうがん かぼちゃ							3回以内	3回以内
食用ぎく							2回以内	2回以内
きく(葉)							1回	1回
バジル							2回以内	2回以内
マッシュルーム	クロバネキノコバエ類	1000倍	1.5 L/m ²	覆土後、 ただし収穫14 日前まで	1回	覆土表面散布	1回	
花き類・観葉 植物	マメハモグリバエ	1000倍	2L/m ²	発生初期	4回以内	土壌灌注	5回以内(土壌 灌注は1回以 内、散布は4回 以内)	
			100~300L /10a			散布		