

# 殺虫剤

名称:フォース粒剤  
種類:テフルトリン粒剤

## 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルトリンを含む農薬の総使用回数	
かんしょ	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類	9kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和又は作条土壌混和	1回	
らっかせい	コガネムシ類幼虫		は種時		播溝土壌混和又は全面土壌混和		
ほうれんそう	ハウレンソウケ ナガコナダニ		は種前				
キャベツ はくさい	ネキリムシ類	4kg/10a	定植時		全面土壌混和		
レタス 非結球レタス		9kg/10a					
しょうが		6~9kg/10a	萌芽期		株元散布		
小倉はくさい菜	キスジノミハムシ	4kg/10a	は種前				全面土壌混和
はつかだいこん	キスジノミハムシ	6~9kg/10a	は種時				全面土壌混和
だいこん							播溝土壌混和
		タネバエ					
かぶ	キスジノミハムシ	4kg/10a					
非結球あぶらな 科葉菜類	ネキリムシ類				全面土壌混和		
なばな類	キスジノミハムシ						

殺虫剤

名称:フォース粒剤  
種類:テフルトリン粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルトリンを含む農薬の総使用回数
にんじん	ネキリムシ類	4~12kg/10a	は種前	1回	全面土壌混和	1回
にんじん(葉)		4kg/10a	は種時		作条土壌混和	
		4kg/10a	は種前		全面土壌混和	
ねぎ	ネキリムシ類	4~9kg/10a	定植時		作条土壌混和	
ブロッコリー 茎ブロッコリー		4kg/10a			全面土壌混和	
パセリ			は種時		播溝土壌混和	
			定植時		植溝土壌混和又は全面土壌混和	
ごぼう		は種時	全面土壌混和			
ザーサイ	キスジノミハムシ					
やまのいも (むかご)	タネバエ	6kg/10a	植付時		植溝土壌混和	
やまのいも						
みしまさいこ	ネキリムシ類	6kg/10a	萌芽期		株元散布	
さとうきび	ハリガネムシ類		植付時		植溝土壌混和	
うめ	アカマダラケシキ スイ	10kg/10a	収穫3日前まで	全面土壌混和		
茶	ナガチャコガネ	9kg/10a	成虫飛来初期から ふ化幼虫期 但し、 摘採7日前まで	雨落ち部土壌混 和		
つつじ類	コガネムシ類幼 虫		植付時	全面土壌混和		
いちご	ネキリムシ類	6kg/10a	植付時(仮植床)	作条土壌混和	2回以内 (仮植床は1回以内、本圃 は1回以内)	
			定植時			