

殺菌剤

名称: フォリオゴールド
種類: メタラキシルM・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数	
ぶどう	べと病	1500倍	200～700L/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内 (休眠期は1回以内)	
ばれいしょ	疫病	500～1000倍	100～400L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内	5回以内	
ミニトマト		800～1000倍			2回以内		4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	2回以内	
トマト		葉かび病			800倍		4回以内	5回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は4回以内)	6回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
きゅうり	うどんこ病 褐斑病			3回以内			4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	10回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)	
	メロン	べと病		800～1000倍	収穫前日まで		3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
うどんこ病 つる枯病		800倍		収穫3日前まで					

殺菌剤

名称: フォリオゴールド
種類: メタラキシルM・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数	
すいか	つる枯病 炭疽病	800倍	100～ 400L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理 は1回以内、は種 後は3回以内)	5回以内	
	褐色腐敗 病	800～ 1000倍						6回以内	
たまねぎ	白色疫病	800倍							5回以内 (種子への処理 は1回以内、土 壤混和は1回以 内、散布は3回 以内)
	灰色かび 病								
ねぎ	べと病	800～ 1000倍		収穫14日 前まで	2回以内		3回以内 (種子への処理 は1回以内、は種 後は2回以内)	3回以内 (は種又は定植 前の土壌混和 は1回以内、散 布及びエアゾル 剤の噴射は合 計2回以内)	
わけぎ									
キャベツ									ピシウム腐 敗病
はくさい	べと病	800～ 1000倍		収穫7日前 まで					
	白さび病	1000倍							

殺菌剤

名称: フォリオゴールド
 種類: メタラキシルM・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
レタス	べと病	800倍	100～400L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	5回以内 (土壌灌注は2回以内、散布は3回以内)
リーフレタス	べと病	800倍		収穫21日前まで	2回以内		3回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は2回以内)	2回以内
らっきょう	白色疫病	1000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内	3回以内
ブロッコリー	べと病			出蕾前 但し、収穫21日前まで	2回以内		4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	3回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は2回以内)
アスパラガス	疫病			収穫開始7日前まで	3回以内			4回以内
かぼちゃ	疫病 べと病			収穫7日前まで				3回以内
なす	褐色腐敗病			800～1000倍				収穫前日まで
	うどんこ病 すすかび病			800倍				