

除草剤

名称: プリグロックスL
種類: ジクワット・パラコート液剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含ま農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
移植水稻	圃場内の周縁部	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800～1000mL/10a	100～150L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回	2回以内	
直播水稻			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日～は種後7日(イネ出芽前)	600～1000mL/10a						4回以内
麦類			は種前又はは種後出芽前雑草生育期	1000～2000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内	
さとうきび		多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫3日前まで							5回以内
未成熟とうもろこし		一年生雑草	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600～1000mL/10a		2回以内		2回以内	2回以内	
とうもろこし(子実)			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下)							4回以内
豆類(種実、ただし、だいず、らつかせいを除く)			は種前又は植付前			3回以内		3回以内	3回以内	
だいず			畦間処理: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで							4回以内
			は種前又は植付前			3回以内		3回以内		
			は種後出芽前雑草生育期(草丈20cm以下)						4回以内	4回以内
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにやく、みずいもを除く)	植付前		2回以内		2回以内	2回以内				
えだまめ	畦間処理: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫14日前まで						2回以内	2回以内	2回以内	
ばれいしょ	萌芽直前		400～600mL/10a		2回以内	2回以内				2回以内
	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで		200～300mL/10a(北海道)							

除草剤

名称: プリグロックスL
種類: ジクワット・パラコート液剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含まない農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量						
かんしょ やまのいも	-	一年生雑草	植付前	600～ 1000mL/10a	100～150L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内		
さといも			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで								
			植付前								
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで								
こんにゃく		植付前									
		植付後から萌芽直前									
果樹類(かんきつを除く)		多年生雑草	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで	800～ 1000mL/10a		5回以内		5回以内	5回以内	5回以内	
			スギナ	1500～ 2000mL/10a							
			一年生雑草	1000～ 2000mL/10a							
かんきつ		多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫前日まで	800～ 1000mL/10a		5回以内		5回以内	5回以内	5回以内	
				スギナ							1500～ 2000mL/10a
				ツククサ							1000～ 2000mL/10a
いちご	-	一年生雑草	は種前又は植付前	600～ 1000mL/10a	100～150L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内			
野菜類(レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)			定植前又は畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで								
			は種前又は植付前								
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで								
			は種前又は植付前								
			は種前又は植付前								
			は種前又は植付前								
			は種前又は植付前								
			は種前又は植付前								
			は種前又は植付前								
			は種前又は植付前								
キャベツ カリフラワー だいこん ごぼう			は種前又は植付前								
トマト きゅうり ほうれんそう ピーマン かぼちゃ	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫14日前まで										

除草剤

名称: プリグロックスL
種類: ジクワット・パラコート液剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートをを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
はくさい ブロッコリー レタス たまねぎ ねぎ にんじん なす すいか メロン しょうが にんにく		一年生雑草	は種前又は植付前	600～ 1000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで						
アスパラガス		スギナ	は種前又は植付前	1000～ 2000mL/10a					
			萌芽前: 雑草生育期(草丈20cm以下) 畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
ふき	-	一年生雑草	萌芽前	600～ 1000mL/10a	100～150L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内
みょうが(花穂)			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫21日前まで						
みょうが(茎葉)			萌芽前						
うど			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
バセリ やまのいも(むかご)			萌芽前						
たけのこ	一年生及び多年生雑草	萌芽前: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで	1000～ 2000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内			
茶	一年生雑草	摘採7日前まで	800～ 1000mL/10a		1回	1回	1回		
桑		春期萌芽前又は伐採後							
たばこ		大土寄期畦間処理: 雑草生育期							

除草剤

名称: プリグロックスL
種類: ジクワット・パラコート液剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
チューリップ	-	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草生育期)	600~ 1000mL/10a	100~150L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	
花き類・観葉植物(チューリップ、すいせんを除く)			畦間処理: 雑草生育期(草丈20cm以下)					3回以内	3回以内	
すいせん			萌芽前(雑草生育期)					3回以内	3回以内	
樹木類			雑草生育期(草丈30cm以下)					3回以内	3回以内	
水田作物 畑作物(休耕田)	休耕田	多年生雑草	雑草生育期	800~ 1000mL/10a		4回以内		4回以内	4回以内	
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔			600~ 1000mL/10a				5回以内	5回以内	5回以内
				1000~ 2000mL/10a						
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、宅地、のり面等	一年生雑草	雑草生育期	1500~ 2000mL/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内		
				800~ 1000mL/10a						
		スギナ	スギナ生育期	1000~ 2000mL/10a						

適用の範囲と使用方法

作物名	使用目的	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
チューリップ	ウイルス罹病株の枯殺	1mL/株	第2葉展開期から開花20日後まで	1回/罹病株	ウイルス罹病株葉への滴下	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)