

適用の範囲と使用方法

2014年1月15日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	シクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数			
				薬量	希釈水量							
移植水稻	—	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800~1000mL/10a	100~150L/10a	1回		1回	2回以内			
直播水稻			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日~は種後7日(イネ出芽前)	600~1000mL/10a								
麦類			は種前又はは種後出芽前雑草生育期							4回以内	4回以内	
さとうきび	圃場内の周縁部	多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫3日前まで	1000~2000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内			
未成熟とうもろこし	—	一年生雑草	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600~1000mL/10a	100~150L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内			
とうもろこし(子実)			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下)							5回以内	5回以内	
豆類(種実、ただし、だいち、らっかせいを除く)			は種前又は植付前 畦間処理: 雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで									
だいち			は種前又は植付前 は種後出芽前雑草生育期(草丈20cm以下) 畦間処理: 雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫3日前まで								4回以内	4回以内
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにやく、みずいもを除く)			植付前								3回以内	3回以内
えだまめ			畦間処理: 雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫14日前まで								4回以内	4回以内
ばれいしょ			萌芽直前							400~600mL/10a 200~300mL/10a(北海道)	2回以内	2回以内(茎葉枯凋は1回以内)
		畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	400~600mL/10a									

適用の範囲と使用方法

2014年1月15日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農業の総使用回数	パラコートを含まる農業の総使用回数
				薬量	希釈水量				
かんしょ やまのいも		一年生雑草	植付前	600~ 1000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
			植付前						
さといも		一年生雑草	畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで						
こんにゃく			植付前						
			植付後から萌芽直前						
果樹類(かんきつを除く)		多年生雑草	畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで	800~ 1000mL/10a		5回以内		5回以内	5回以内
		スギナ	雑草生育期 但し、収穫前日まで	1500~ 2000mL/10a					
かんきつ		一年生雑草	畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで	1000~ 2000mL/10a					
		多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫前日まで	800~ 1000mL/10a					
いちご		一年生雑草	は種前又は植付前				雑草茎葉散布		
			定植前又は畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで						
野菜類(レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)		一年生雑草	は種前又は植付前					3回以内	3回以内
			は種前又は植付前						
キャベツ カリフラワー だいこん ごぼう			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
			は種前又は植付前						
トマト きゅうり ほうれんそう ピーマン かぼちゃ			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで						

適用の範囲と使用方法

2014年1月15日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含まれる農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
はくさい ブロッコリー レタス たまねぎ ねぎ にんじん なす すいか メロン しょうが にんにく		一年生雑草	は種前又は植付前	600～ 1000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで						
アスパラガス		スギナ	は種前又は植付前	1000～ 2000mL/10a					
			萌芽前: 雑草生育期(草丈20cm以下) 畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
ふき	-	一年生雑草	萌芽前	100～150L/10a		2回以内	雑草莖葉散布	2回以内	2回以内
みょうが(花穂)			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫21日前まで						
みょうが(莖葉)			萌芽前						
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
うど			萌芽前						
			畦間処理: 雑草生育期 但し、みょうが(花穂)の収穫30日前まで、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで						
パセリ やまのいも(むかご)			畦間処理: 雑草生育期(根株養成期) 但し、収穫75日前まで						
	は種前又は植付前								
たけのこ	一年生及び多年生雑草	萌芽前: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで	1000～ 2000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内	
茶	一年生雑草	摘採7日前まで	800～ 1000mL/10a		1回		1回	1回	
桑		春期萌芽前又は伐採後							
たばこ		大土寄期畦間処理: 雑草生育期							

適用の範囲と使用方法

2014年1月15日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農業の総使用回数	パラコートを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量				
チューリップ	-	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草生育期)	600~ 1000mL/10a	100~150L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
花き類・観葉植物 (チューリップ、すいせんを除く)			畦間処理: 雑草 生育期(草丈 20cm以下)						
すいせん			萌芽前(雑草生 育期)						
樹木類			雑草生育期(草 丈30cm以下)						
水田作物 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	800~ 1000mL/10a	100~150L/10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内	4回以内
水田作物(水田 畦畔)	水田畦畔			600~ 1000mL/10a		5回以内		5回以内	5回以内
				1000~ 2000mL/10a				3回以内	3回以内
樹木等	公園、庭園、堤 とう、駐車場、 道路、宅地、の り面等			多年生雑草		1500~ 2000mL/10a			
		一年生雑草	800~ 1000mL/10a						
		スギナ	スギナ生育期	1000~ 2000mL/10a					

適用の範囲と使用方法

作物名	使用目的	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農業の 総使用回数	パラコートを含む農業の 総使用回数
チューリップ	ウイルス罹病株 の枯殺	1mL/株	第2葉展開期か ら開花20日後ま で	1回/罹病株	ウイルス罹病株 葉への滴下	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺 は1回以内)	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺 は1回以内)