

## 除草剤

名称:ボクサー  
種類:プロスルホカルブ乳剤

適用の範囲と使用方法

2016年10月19日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	プロスルホカルブを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
小麦	一年生雑草	秋播栽培のは種後 ～麦2葉期 (雑草発生前～発生始期)	400 ～ 500mL/10a	50～100L /10a	2回以内	雑草茎葉散 布又は全面 土壌散布	2回以内
		秋播栽培の麦2～4葉期 (雑草発生前～発生始期)		70～100L /10a			
		春播栽培の は種後出芽前～出芽揃期 (雑草発生前～発生始期)		100L/10a			
大麦		500mL/10a	70～100L /10a				
麦類 (大麦、小麦 を除く)		秋播栽培の は種後～麦2葉期 (雑草発生前～発生始期)					
たまねぎ		定植後又は中耕後 (雑草発生前) 但し、収穫45日前まで	400 ～ 500mL/10a	100L/10a			
とうもろこし 飼料用 とうもろこし	は種後出芽前 (雑草発生前)	1回					
ばれいしょ	植付後萌芽前 (雑草発生前)		1回				