

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数			
りんご	ハマキムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内			
	キンモンホソガ	2000～3000倍								
かんしょ	ハスモンヨトウ		2000～3000倍	2回以内	2回以内		2回以内			
	ナカジロシタバ									
キャベツ	コナガ			3000倍	3回以内		3回以内	3回以内		
	アオムシ									
ヨトウムシ										
はくさい	コナガ				2000～3000倍		3回以内		3回以内	3回以内
	アオムシ									
レタス	オオタバコガ				2000倍		3回以内		3回以内	3回以内
非結球レタス										
だいこん	コナガ	3000倍			3回以内	3回以内	3回以内			
アオムシ										
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍	3回以内		3回以内	3回以内				
ねぎ	シロイチモジヨトウ									
わけぎ		2000倍	3回以内	3回以内	3回以内					
なす	オオタバコガ					2000～3000倍	4回以内	4回以内		
トマト	オオタバコガ	3000倍	4回以内	4回以内	4回以内					
	ハスモンヨトウ									
	ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍								
	トマトサビダニ	2000倍								
コナジラミ類										
	ハモグリバエ類	1000倍								

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
ミニトマト	オオタバコガ	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ	3000倍					
	ミカンキイロアザミウマ トマトサビダニ コナジラミ類	2000倍					
ピーマン	オオタバコガ	1000～2000倍	25L/10a	収穫14日前まで	4回以内		4回以内
きゅうり	ウリノメイガ コナジラミ類				3回以内		3回以内
いちご	ミカンキイロアザミウマ	3000倍	100～150L/10a	収穫7日前まで	4回以内		4回以内
	ハスモンヨトウ	750倍					
てんさい	ヨトウムシ	3000倍	100～150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
	カメノコハムシ						
	アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ						
だいず	ハスモンヨトウ	3000倍	80～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
えだまめ			100～300L/10a				

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
とうがらし類	オオタバコガ	2000倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内
非結球あぶらな科葉菜類	アオムシ コナガ			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
しそ	シソサビダニ						2回以内
みかん	チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ	2000～ 3000倍	200～ 700L/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
かんきつ (みかんを除く)	アゲハ類 ヨモギエダシャク			収穫21日前まで			
茶	チャハマキ チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホソガ		200～ 400L/10a	摘採7日前まで	1回		1回
きく	ミカンキイロアザミウマ マメハモグリバエ	1000倍	100～ 300L/10a	発生初期	5回以内		5回以内
花き類・観葉植物(きくを除く)	ハスモンヨトウ	2000倍					