

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

2016年06月22日 現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数															
りんご	ハマキムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内															
	キンモンホソガ	2000～3000倍																				
かんしょ	ハスモンヨトウ		2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで		2回以内	2回以内														
	ナカジロシタバ																					
キャベツ	コナガ				2000～3000倍		100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内												
	アオムシ																					
ヨトウムシ																						
はくさい	コナガ							2000～3000倍			100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	3回以内								
	アオムシ																					
レタス	オオタバコガ											2000倍			収穫14日前まで	3回以内	3回以内					
非結球レタス																						
だいこん	コナガ	2000倍				100～300L/10a									収穫7日前まで			3回以内	3回以内			
ブロッコリー	アオムシ																					
	ハスモンヨトウ																					
ねぎ	シロイチモジヨトウ		2000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで		3回以内		3回以内													
わけぎ																						
なす	オオタバコガ				2000～3000倍					100～300L/10a					収穫前日まで					4回以内	4回以内	
トマト	ハスモンヨトウ							2000～3000倍			100～300L/10a		収穫前日まで	4回以内								4回以内
	ミカンキイロアザミウマ																					
	トマトサビダニ																					
	コナジラミ類																					
	ハモグリバエ類																					

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

2016年06月22日 現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数	
ミニトマト	オオタバコガ	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
	ハスモンヨトウ	3000倍						
	ミカンキイロアザミウマ トマトサビダニ コナジラミ類	2000倍						
ピーマン	オオタバコガ	4回以内						4回以内
きゅうり	ウリノメイガ コナジラミ類	3回以内						3回以内
いちご	ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍						4回以内
	ハスモンヨトウ	3000倍						
てんさい	ヨトウムシ	750倍	25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	カメノコハムシ アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ	3000倍	100～150L/10a					
だいず	ハスモンヨトウ	3000倍	80～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
えだまめ			100～300L/10a					

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

2016年06月22日 現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
とうがらし類	オオタバコガ	2000倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内
非結球あぶらな科葉菜類	アオムシ コナガ			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
しそ	シソサビダニ						2回以内
みかん	チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ	2000～ 3000倍	200～ 700L/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
かんきつ (みかんを除く)	アゲハ類 ヨモギエダシヤク			収穫21日前まで			
茶	チャハマキ チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホソガ		200～ 400L/10a	摘採7日前まで	1回		1回
きく	ミカンキイロアザミウマ マメハモグリバエ	1000倍	100～ 300L/10a	発生初期	5回以内		5回以内
花き類・観葉植物(きくを除く)	ハスモンヨトウ	2000倍					