

### 殺虫剤

名称:リーズン顆粒水和剤  
種類:チアメトキサム・ルフエヌロン水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年07月25日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	ルフエヌロンを含む農薬の総使用回数	
てんさい	アブラムシ類 ヨトウムシ	3000倍	100～ 150L/10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	5回以内 (種子への処理は1回 以内、苗床灌注は1回 以内、散布は3回以 内)	2回以内	
りんご	クワコナカイガラ ムシ ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヨモギエダシャク	2000倍	200～ 700L/10a				3回以内	2回以内	3回以内
	ギンモンハモグリ ガ キンモンホソガ アブラムシ類 リンゴサビダニ							3回以内	
みかん	チャノキイロアザミ ウマ アゲハ類 ミカンハモグリガ	2000 ～3000倍							
かんきつ (みかんを除く)	ゴマダラカミキリ成 虫 ミカンサビダニ			収穫21日前 まで					
茶	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコ バイ チャノキイロアザミ ウマ ヨモギエダシャク チャハマキ チャノココクモンハ マキ	2000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	1回		1回		