

殺菌剤

名称:リドミルゴールドMZ  
種類:マンゼブ・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

2014年08月27日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数		
ばれいしょ	疫病	500~1000倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	10回以内(無人ヘリ散布は3回以内)	3回以内		
トマト		1000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内	5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内)		
キャベツ	べと病			収穫30日前まで	3回以内		3回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)		
ねぎ								5回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内)		
きゅうり	メロン			1000倍	200~700L/10a		収穫前日まで	2回以内	2回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
ぶどう							収穫7日前まで			
みかん	褐色腐敗病			500倍	100~300L/10a		収穫45日前まで	2回以内	2回以内	4回以内
はくさい	べと病									
かぼちゃ	ピシウム腐敗病			500倍	100~300L/10a		収穫7日前まで	2回以内	2回以内	5回以内
たまねぎ	疫病	500倍								
あずき	べと病		500倍	100~300L/10a	収穫45日前まで	3回以内	3回以内	4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)		
だいず	褐色腐敗病	1000倍							200~400L/10a	収穫7日前まで
すいか	白さび病		1000倍	200~400L/10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)		
わさびだいこん	疫病	1000倍							50mL/株(200~400L/10a)	育苗期
いちご										