

殺菌剤

名称:リドミルゴールドMZ  
種類:マンゼブ・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	500~1000倍		収穫30日前まで	1回		10回以内(無人ヘリ散布は3回以内)	3回以内
トマト				収穫前日まで	2回以内		2回以内	5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内)
キャベツ	べと病	1000倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
ねぎ								5回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
きゅうり								4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
メロン		5回以内						
ぶどう		200~700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	2回以内		2回以内	
みかん		褐色腐敗病					4回以内	
はくさい	べと病 ピシウム腐敗病			収穫30日前まで	1回	1回	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	
かぼちゃ	疫病				2回以内	2回以内		
たまねぎ	べと病 白色疫病			収穫7日前まで			5回以内	
あずき	茎疫病	500倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	3回以内		3回以内	4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)
だいず	べと病			収穫45日前まで				4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)
すいか	褐色腐敗病			収穫7日前まで			7回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
わさびだいこん	白さび病		200~400L/10a	収穫14日前まで			3回以内	
いちご	疫病	1000倍	50mL/株(200~400L/10a)	育苗期			6回以内	5回以内(種子への処理は1回以内、育苗期は3回以内、定植時の土壌混和は1回以内)