

## 殺菌剤

名称:レーバスフロアブル  
種類:マンジプロパミド水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年3月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンジプロパミドを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	375～500倍	25L/10a		2回以内		2回以内
		1500～2000倍	60～200L/10a				
えだまめ	べと病	1500～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで			
	茎疫病	1500～2000倍					
だいず	べと病	1500～3000倍	60～200L/10a		3回以内		3回以内
あずき	茎疫病	1500～2000倍					
いちご	疫病	2000倍	100～300L/10a	育苗期	2回以内	散布	4回以内 (育苗期は2回以内、生育期は2回以内)
いちじく				生育期、但し収穫前日まで			
かんきつ	褐色腐敗病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで			
ホップ				収穫14日前まで			
ぶどう	べと病	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
はくさい レタス 非結球レタス キャベツ		2000倍			2回以内		2回以内
ブロッコリー ねぎ							

## 殺菌剤

名称:レーバスフロアブル  
種類:マンジプロパミド水和剤

適用の範囲と使用方法

2018年3月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンジプロパミドを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	べと病	2000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
バジル				収穫前日まで			
たまねぎ	白色疫病						
すいか	褐色腐敗病						
なす	疫病	1500～2000倍	3回以内	3回以内	2回以内		
トマト		2000倍					
ミニトマト			1000倍				
ピーマン		100～180L /10a		収穫10日前まで			
たばこ							