

殺菌剤

名称:レーバスフロアブル
種類:マンジプロバミド水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンジプロバミドを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	375～500倍	25L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
		1500～2000倍					
だいず	べと病	1500～3000倍	60～200L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
	茎疫病	1500～2000倍					
あずき							
ホップ	べと病	2000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	2回以内		4回以内 (育苗期は2回以内、生育期は2回以内)
いちご	疫病		100～300L/10a	生育期、但し収穫前日まで			
				育苗期			
かんきつ	褐色腐敗病				収穫前日まで		
ぶどう	べと病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで			
いちじく	疫病			収穫14日前まで	2回以内		2回以内
バジル	べと病	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで			
ブロッコリー				収穫7日前まで	3回以内		3回以内
はくさい							
レタス 非結球レタス キャベツ							
ほうれんそう				収穫3日前まで	2回以内		2回以内
ねぎ				収穫7日前まで			
たまねぎ				白色疫病	収穫前日まで		3回以内
すいか				褐色腐敗病			
なす							
トマト				疫病	1500～2000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで
ミニトマト	2000倍						
ピーマン		1000倍					
たばこ							