

## 除草剤

名称:レグロックス  
種類:ジクワット液剤

適用の範囲と使用方法

2011年10月12日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類	—	果樹園下草一年生雑草	雑草生育期 但し、収穫30日前まで	300～500mL/10a	70～100L/10a	5回以内	雑草茎葉散布	5回以内
ばれいしょ		雑草生育期(黄変期～枯凋期) 但し、収穫14日前まで	200～300mL/10a	2回以内		2回以内(茎葉枯凋は1回以内)		
麦類		雑草生育期 但し、は種5～10日前	400mL/10a	1回		4回以内		
桑		雑草生育期(春期発芽前又は夏切後)	300～500mL/10a	3回以内		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布		3回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、宅地、のり面等	雑草生育期						

作物名	使用目的	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	茎葉枯凋	200～300mL/10a	70～100L/10a	黄変期～枯凋期 但し、収穫14日前まで	1回	散布	2回以内(茎葉枯凋は1回以内)
		300mL/10a		開花後30日～黄変期(茎葉繁茂期) 但し、収穫14日前まで			