

殺虫剤

名称:アグリメック
 種類:アバメクチン乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年03月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	アザミウマ類	1000 ～2000倍	200～ 700L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内		
	チャノホコリダニ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ	2000倍							
ねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	500 ～1000倍	100～ 300L/10a	収穫3日前 まで					
なす メロン ピーマン	アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類			収穫前日 まで					
すいか	アザミウマ類 ハダニ類								
トマト	アザミウマ類 コナジラミ類 トマトサビダニ トマトハモグリバエ								
きゅうり	アザミウマ類 コナジラミ類	1000倍	200～ 700L/10a	親株育成期				2回以内	2回以内
いちご	ハダニ類			育苗期					
				ホップ	収穫30日前 まで				

殺虫剤

名称:アグリメック
種類:アバメクチン乳剤

適用の範囲と使用方法

2018年03月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む農薬の総使用回数
茶	カンザワハダニ チャトゲコナジラミ チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャノナガサビダニ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノミドリヒメヨコバイ	1000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
花き類・観葉植物 (ガーベラを除く)	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類	500倍	100～ 300L/10a	発生初期	5回以内		5回以内
ガーベラ	トマトハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ ハダニ類						