

殺虫剤

名称:アグリメック
種類:アバメクチン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む農薬の総使用回数
なす メロン ピーマン	アザミウマ類 ハダニ類 タバココナジラミ類 (シルバーリーフコ ナジラミを含む)	500~ 1000倍	100~ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
すいか	アザミウマ類 ハダニ類			収穫3日前 まで			
ねぎ	ネギアザミ ウマ ネギハモグリバエ						
茶	チャノキイロアザミ ウマ チャノナガサビダ ニ チャノホソガ カンザワハダニ チャノホコリダニ チャノコカクモンハ マキ チャトゲコナジラミ チャノミドリヒメヨコ バイ	1000倍	200~ 400L/10a	摘採7日前 まで	1回	1回	
ホップ	ハダニ類		200~ 700L/10a	収穫30日前 まで	2回以内		2回以内

殺虫剤

名称:アグリメック
種類:アバメクチン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物 (ガーベラを除く)	ミカンキイロアザミ ウマ ハダニ類	500倍	100～ 300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ガーベラ	トマトハモグリバエ ミカンキイロアザミ ウマ ハダニ類						