

殺虫剤

名称:ミネクトデュオ粒剤
種類:シアントラニリブロール・チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリブロールを含む農薬の総使用回数 | チアメトキサムを含む農薬の総使用回数 |
|--------|--|---|---|-------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| キャベツ | アオムシ | 1 g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
| | アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ | | | | | | |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り40 g | は種覆土後～育苗期後半 | | 散布 | | |
| レタス | アブラムシ類 ネキリムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り40 g | 育苗期後半 | | | | |
| | オオタバコガ ナモグリバエ | | | | | | |
| はくさい | アブラムシ類 アオムシ コナガ | 1 g/株 | 定植時 | | 株元散布 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
| | アブラムシ類 アオムシ コナガ カブラハバチ ハイマダラノメイガ | | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り40 g | は種覆土後～育苗期後半 | 散布 | | |

殺虫剤

名称:ミネクトデュオ粒剤
種類:シアントラニリブロール・チアメキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリブロールを含む農薬の総使用回数 | チアメキサムを含む農薬の総使用回数 |
|------|---------------------------------------|-------|------------|---------|------|-------------------------------------|---------------------------------|
| きゅうり | アザミウマ類 | 1 g/株 | 鉢上げ時～育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
| | アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 | | | | | | |
| トマト | アザミウマ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時～育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
| | アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 | | | | | | |
| ピーマン | アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時～育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
| なす | アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時～育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |